



## راهنمای کشوری مراقبت فاسیولیازیس

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


معاونت سلامت

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

### گرد آورندگان:

- مهندس محرم مافی - کارشناس ارشد انگل شناسی و MPH مدیریت بیماریها - مرکز مدیریت بیماریها (۴۳)  
دکتر کیهان اشرفی (Ph.D) - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (۴۴)  
دکتر سید محمود رضوانی - گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (۴۳)  
دکتر سید محسن زهرایی متخصص بیماریهای عفونی - مرکز مدیریت بیماریها (۴۵)  
دکتر حسین معصومی اصل فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان - مرکز مدیریت بیماریها (۴۲)  
مصطفی میرزائزاد - کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  
علیرضا رسایی - کارشناس ارشد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

با همکاری اعضاء محترم کمیته کشوری مراقبت فاسیولیازیس



شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۹-۱۴۱-۰

ISBN: 978-964-519-141-0

نام کتاب:	راهنمای کشوری مراقبت فاسیولیزیس
تالیف:	مهندس محرم مافی - دکتر کیهان اشرفی - دکتر سید محمود رضوانی - دکتر سید محسن زهرایی - دکتر حسین معصومی اصل - مصطفی میرزائزاد - مهندس علیرضا رسایی
ناشر:	اندیشمند
تاریخ و نوبت چاپ:	اول - ۱۳۹۱
شمارگان:	
قیمت:	۰ ریال

عنوان و نام پدیدآور	راهنمای کشوری مراقبت فاسیولیزیس / گردآوردگان محرم مافی... (و دیگران)؛ با همکاری اعضای محترم کمیته کشوری مراقبت فاسیولیزیس؛ (به سفارش) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت سلامت، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر.
مشخصات نشر	تهران: اندیشمند، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهری	۸۸ ص:، مصور، نمودار.
شابک	رایگان: 978-964-519-141-0
وضعیت فهرست	فیا
یادداشت	گردآوردگان محرم مافی، کیهان اشرفی، سیدمحمود رضوانی، محسن زهرایی، حسین معصومی اصل، مصطفی میرزائزاد، علیرضا رسایی.
یادداشت	کتابنامه.
موضوع	فاسیولیز
شناسه افزوده	مافی، محرم، ۱۳۴۳
شناسه افزوده	ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت بیماریها
شناسه افزوده	ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته کشوری مراقبت فاسیولیزیس
رده بندی کنگره	۱۳۹۱ ۵۲۵ ف/ RCA۴۸
رده بندی دیویی	۶۱۶/۹۶۳
شماره کتابشناسی ملی	۳۰۷۵۳۰۲

انتشارات اندیشمند: تهران - خ دانشگاه - خ روانمهر - پلاک ۴۴ - واحد ۲ - تلفن ۶۶۹۶۷۲۷۲  
فاکس ۶۶۹۵۲۶۱۷. صندوق پستی ۷۴۵۵-۱۹۳۹۵. Email: Andishmandpress@gmail.com

## لیست اعضای کمیته فنی کشوری مراقبت فاسیولیازیس

دکتر عبدالحسین ندیم

دکتر محمد مهدی گویا

دکتر مصطفی رضائیان

دکتر جعفر مسعود

دکتر محمدباقر رکنی

دکتر محمود نبوی

دکتر مهدی آسمار

دکتر حسین معصومی اصل

دکتر سید محسن زهرایی

دکتر کیهان اشرفی

دکتر داوود یادگاری

مهندس محرم مافی

دکتر سید محمود رضوانی

---

---

فهرست

---

---

صفحه	فهرست مطالب
۷	۱- فصل اول (کلیات بیماری)
۸	تعریف بیماری
۸	اهمیت بیماری
۱۱	عامل بیماری
۱۴	ناقل بیماری
۱۶	مخزن
۱۷	انتشار جغرافیایی فاسیولیاژیس در جهان
۲۳	انتشار فاسیولیاژیس در جمهوری اسلامی ایران
۲۶	سیر تکامل انگل‌های فاسیولا
۳۰	چگونگی ابتلای انسان به فاسیولیاژیس
۳۷	فصل دوم (مراقبت بالینی و درمان فاسیولیاژیس)
۳۸	بیماری‌زایی و تظاهرات بالینی
۳۹	مراحل کلینیکی مختلف در افراد آلوده به فاسیولیاژیس
۴۱	فاسیولیاژیس نابجا
۴۲	تشخیص فاسیولیاژیس
۴۲	الف- تشخیص بالینی
۴۲	ب- تشخیص آزمایشگاهی

---

---

## فهرست

---

---

۴۶	یافته های آزمایشگاهی مهم در تشخیص فاسیولیاژیس
۴۷	موارد کاربردی مهم در تشخیص فاسیولیاژیس در فاز حاد و مزمن
۴۹	تشخیص های افتراقی
۵۰	درمان
۵۲	پیگیری و مراقبت پس از درمان
۵۳	معیارها و ملاکهای مهم درمانی در بیماران مبتلا به فاسیولیاژیس
۵۵	ملاکها و معیارهای مهم شکست درمان
۵۷	<b>فصل سوم (مراقبت اپیدمیولوژیک فاسیولیاژیس)</b>
۳۰	تعاریف بیماری
۳۰	طبقه بندی موارد فاسیولیاژیس بر اساس نظریه کمیته کشوری
۲۵	طبقه بندی جدید اپیدمیولوژیک فاسیولیاژیس انسانی
۳۲	اقدامات پیشگیری و کنترل فاسیولیاژیس
۳۲	اقدامات لازم در همه گیری ها
۳۳	اهداف کلی و اختصاصی برنامه کنترل فاسیولیاژیس در ایران
۳۳	استراتژی های برنامه کنترل فاسیولیاژیس در ایران
۳۴	شرح وظایف سطوح مختلف نظام سلامت در برنامه مراقبت فاسیولیاژیس
۳۶	فرم های ثبت و جمع آوری و گزارش داده های برنامه مراقبت

---

---

## فهرست

---

---

	فاسیولیاژیس
۳۹	فرم بیماریابی فاسیولیاژیس انسانی
۴۰	فرم بررسی اپیدمیولوژیک فاسیولیاژیس
۴۱	فرم گزارش خلاصه اطلاعات موارد فاسیولیاژیس
۴۲	منابع

### پیشگفتار

بیماریهای انگلی کرمی از مشکلات مهم بهداشتی ایران و اغلب کشورهای جهان هستند و مبارزه با آنها همیشه بخش عمده ای از هزینه برنامه های توسعه ملی را به خود اختصاص داده است.

در حالی که انتشار و انتقال بسیاری از عفونت های کرمی روده ای از جمله فاسیولا ها را می توان با رفع کمبودهای موجود در تسهیلات بهسازی محیط، دفع بهداشتی فضولات انسانی و تامین آب آشامیدنی سالم با هزینه نسبتا کمی تحت کنترل در آورد ولی متاسفانه عدم تخصیص منابع مالی و ناکافی بودن برنامه های آموزشی در جهت افزایش آگاهی مردم به چگونگی راه انتقال و پیشگیری فردی از این آلودگی ها، سبب گردیده است تا خسارات بهداشتی و اقتصادی این عفونت ها مانع بزرگی در راه موفقیت کامل برنامه های توسعه ملی کشور ما در آید.

از طرف دیگر با توسعه ارتباطات، دنیا کوچکتر شده است و انگل ها بویژه انگل های منتقله از طریق مصرف مواد غذایی، سریعتر از پیش می توانند از یک نقطه به نقطه دیگری از جهان منتقل شوند و در برخی موارد نیز الگوی اجتماعی ما محیط مطلوبتری را برای انگل ها فراهم آورده است.

روش های مختلف تشخیصی و درمانی بیماریهای انگلی نیز مثل سایر عفونت ها دستخوش تغییر و تحول می گردد و لذا لازم است تا پزشکان و همه

پرسنل شاغل در برنامه های نظام سلامت معلومات خود را در این زمینه ها بصورت مستمر افزایش دهند.

بیماری فاسیولیازیس یکی بیماریهای مهم انگلی است که به وسیله دو گونه ترماتود کبدی از جنس فاسیولا به نام فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا در انسانها و دامها به وجود می آید. این انگل در اکثر نقاط دنیا و به ویژه مناطقی که پرورش گوسفند، گاو و گاومیش در آن رواج دارد مشاهده می شود عفونت با این انگل در انسان ها نیز مثل دام ها به شکل مزمن، تحت حاد و حاد ظاهر می کند در ایران فاسیولیازیس تاریخچه ای طولانی داشته و همواره به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی در اغلب استانها بویژه استانهای شمالی کشور مورد توجه قرار داشته است

با توجه اجرای برنامه مراقبت بیماری فاسیولیازیس در نظام شبکه بهداشتی کشور، جهت استفاده بهینه کلیه کارکنان بهداشتی درمانی، راهنمای کشوری مراقبت فاسیولیازیس با همکاری کلیه صاحب نظران و اساتید و اعضاء کمیته فنی کشوری و تیم کارشناسی ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کارشناسان مسئول سایر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تدوین شده است.

امیدوارم نتایج حاصل از اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل، موجب دستیابی به کنترل و پیشگیری بیماری در نقاط مختلف کشور گردد و مورد



استفاده کلیه کارشناسان و پزشکان و همچنین برنامه ریزان و پرسنل فنی سطوح مختلف نظام شبکه بهداشت و درمان کشور قرار گیرد. از کلیه همکاران عزیزم که در تهیه این راهنما تلاش نمودند و در اجرای دقیق آن همکاری خواهند داشت تشکر می نمایم.

دکتر محمد مهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

معاونت بهداشت

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی



## فصل اول

### کلیات بیماری فاسیولیازیس

### تعریف بیماری

فاسیولیاژیس به عفونت ناشی از ابتلای انسان‌ها و دام‌ها به انگل‌های جنس فاسیولا (فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانیتیکا) اطلاق می‌شود. انگل‌های فاسیولا کرم‌های برگ‌ی شکل از رده ترماتودها می‌باشند که انگل طبیعی حیوانات نشخوارکننده از جمله گوسفند، بز، گاو، گاو میش و ... می‌باشند. این کرم‌ها مراحل اولیه رشد خود را در بافت کبد طی کرده و پس از بلوغ جنسی، در مجاری صفراوی کبد مستقر می‌شوند و منجر به آسیب کبدی، بزرگی کبد، ضایعات بافتی این عضو و همچنین بروز درد در ناحیه راست یک چهارم فوقانی شکم، واکنش‌های آلرژیک از جمله کهیر و افزایش انوزینوفیل‌ها می‌شوند. استقرار طولانی مدت انگل در مجاری صفراوی منجر به فیروز آن و در نتیجه انسداد این مجاری و ایجاد یرقان انسدادی می‌شود. آلودگی خارج کبدی با این انگل، به خصوص نوع فاسیولا ژیگانیتیکا، ممکن است سبب ضایعات جلدی و یا گرفتاری سایر نقاط بدن به ویژه احشاء شکمی گردد.

### اهمیت بیماری

در سال‌های اخیر اهمیت عفونت‌های ترماتودی منتقله به وسیله غذا و لزوم پایه‌ریزی اقدامات کنترلی در مقابل آنها، مورد تأکید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است و فاسیولیاژیس و سایر ترماتودهای منتقله به وسیله غذا به

لیست عفونت‌های کرمی تأثیرگذار بر تکامل انسان‌ها افزوده شده‌اند. همچنین تغییرات آب و هوایی در جهان به میزان فزاینده‌ای بر روی آن دسته از عفونت‌های کرمی که انتقال آنها به شدت به فاکتورهای محیطی وابسته است، تأثیر قابل توجهی داشته است. فاسیولیاژیس مثال خوبی از یک بیماری انگلی نوپدید/ بازپدید (emerging/re-emerging parasitic disease) است که میزان شیوع و بروز آن در بسیاری از کشورها تحت تأثیر پدیده‌های مرتبط با تغییرات محیطی و تغییرات انسان ساز قرار گرفته است (۱ و ۲).

فاسیولیاژیس یک بیماری انگلی است که به وسیله دو گونه ترماتود کبدی از جنس فاسیولا به نام فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا در انسان‌ها و دام‌ها به وجود می‌آید. فاسیولا هپاتیکا در تمامی قاره‌های جهان انتشار دارد در حالی که انتشار فاسیولا ژیگانتیکا عمدتاً محدود به آفریقا و آسیا می‌باشد، هر چند که در بعضی از مناطق اروپا، ترکیه، خاور نزدیک، برخی از جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی سابق به ویژه ارمنستان کانون‌هایی با اهمیت کمتر وجود دارد (۳ و ۴).

فاسیولیاژیس تا ۳-۲ دهه اخیر غالباً اهمیت دامپزشکی داشته و لطمات اقتصادی قابل توجهی به صنعت دامپروری انسان وارد نموده است. این در حالی است که موارد انسانی بیماری عمدتاً به صورت تک گیر از بعضی مناطق دنیا گزارش شده است. بنابراین تا اواسط دهه ۹۰ به عنوان یک مشکل ثانویه مورد توجه انسان بوده است. به دنبال گزارش و ثبت موارد بالایی از

بیماری در چند دهه اخیر، فاسیولیاژیس انسانی به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی مورد توجه سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است. در حال حاضر این بیماری از ۵۱ کشور جهان و از تمامی قاره‌ها گزارش می‌شود. تعداد افراد آلوده در دنیا ۱۷-۲/۴ میلیون نفر و تعداد افراد در معرض خطر ۱۸۰ میلیون نفر برآورد شده است. تعداد افراد در معرض خطر در ایران حدود ۶ میلیون نفر تخمین زده شده است.

بنابراین روشن است که چهره اپیدمیولوژیک این بیماری در طول چند دهه گذشته به میزان زیادی تغییر یافته است و امروزه درک ما از فاسیولیاژیس کاملاً متفاوت است و به آن صرفاً به عنوان یک مشکل دامپزشکی نمی‌نگریم. هر چند که فاسیولیاژیس یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است و حیوانات نشخوارکننده آلوده منبع اصلی عفونت‌های انسانی می‌باشند، ولی در بعضی مناطق شیوع بالای عفونت در انسان ضرورتاً مرتبط با شیوع بالای عفونت‌های دامی نیست و حیوانات دیگر (*Rattus rattus*) و یا انسان به عنوان مخزن عفونت مطرح می‌باشند. مطالعات اخیر نشان داده است که انسان‌ها نقش مهمی در انتقال این ترماتود کبیدی، حداقل در مناطق هیپراندمیک بیماری (مثل کشور بولیوی) ایفا می‌کنند. فاسیولیاژیس غالباً یک بیماری روستایی است و گله‌داران بیشتر از سایر مشاغل اجتماعی به این بیماری مبتلا می‌شوند. کانون‌های مهم آندمیک بیماری انسانی در آمریکای

جنوبی (بولیوی، پرو، اکوادور)، در آفریقا (مصر)، در اروپا (فرانسه، اسپانیا و پرتغال) و در آسیا (ایران و ویتنام) می‌باشند (۷-۵).

### عامل بیماری


عامل بیماری فاسیولیازیس یک انگل برگی شکل از خانواده کرم‌های مسطح و از رده ترماتودها (Trematoda) می‌باشد. در حال حاضر ۲ گونه قابل قبول از جنس فاسیولا (فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا) سبب ایجاد عفونت در حیوانات اهلی و انسان‌ها می‌گردند. در حالی که در آمریکای جنوبی و غالب مناطق اروپا، فاسیولا هپاتیکا تنها انگل موجود است و تمامی عفونت‌های انسانی به این انگل نسبت داده می‌شود؛ در آسیا و آفریقا همپوشانی انتشار این دو انگل، تعیین هویت دقیق گونه درگیر در عفونت‌های انسانی را مشکل نموده است. وجود همزمان فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا در دام‌های ایران نیز به فراوانی مشاهده می‌شود و مطالعات انجام گرفته بر روی انگل‌های فاسیولای دام‌های بومی گیلان با استفاده از معیارهای مورفومتریک استاندارد (بررسی اندازه‌های ارگان‌های مختلف بدن مانند نسبت طول به عرض و مقایسه آن با اندازه‌های انگل‌های خالص)، وجود اشکال حد واسط این دو انگل را نیز نشان داده است (۸ و ۹).

### فاسیولا هیپاتیکا

مرحله بالغ انگل، مسطح و برگی شکل و به طول ۳۰-۲۰ میلی متر (گاهی بیشتر) و عرض ۱۳-۶ میلی متر است. این انگل دارای ۲ عدد بادکش است که در قسمت مخروطی شکل فوقانی بدن که مخروط رأسی نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند. مخروط رأسی (cephalic cone) در فاسیولا هیپاتیکا کاملاً واضح و مشخص است و حالتی شبیه سر و شانه انسان به وجود می‌آورد و از ویژگی‌های تشخیصی انگل‌های جنس فاسیولاست (شکل ۱) قسمت انتهایی بدن از پهنای کمتری برخوردار است و تا حدودی نوک تیز می‌باشد. مری کاملاً مشخص و سکوم‌ها بلند و منشعب هستند و تا قسمت انتهایی بدن امتداد می‌یابند و تعداد زیادی شاخه جانبی ایجاد می‌کنند. بیضه‌های منشعب نیز در دو چهارم میانی بدن قرار می‌گیرند.

تخم‌دان منشعب، معمولاً در قسمت چپ بدن و قبل از بیضه‌ها قرار می‌گیرد. غدد ویتلین قسمت اعظم نواحی پشتی و جانبی بدن را اشغال می‌کند. زهدان، نسبتاً کوتاه و واجد چند پیچش می‌باشد که بین تخمدان و محل دو شاخه شدن روده قرار می‌گیرد. تخم‌ها اپرکول دار، بیضی شکل، زرد رنگ و در موقع دفع فاقد جنین می‌باشند و اندازه آنها ۹۰-۶۳ × ۱۵۰ - ۱۳۰ میکرون است. این تخم‌ها به راحتی از تخم‌های فاسیولا ژیگانیتیکا قابل تمایز نیستند (۱۰).






شکل ۱- بالغ فاسیولا هیاتیکا

### فاسیولا ژیگانتیکا

این ترماتود از نظر مورفولوژی به فاسیولا هیاتیکا شباهت دارد، ولی شانه‌ها کمتر تکامل یافته، مخروط رأسی کوتاه تر و انگل بسیار طویل تر و کمی باریک تر است. متوسط نسبت طول به عرض انگل در فاسیولا ژیگانتیکا بیش از دو برابر فاسیولا هیاتیکا می‌باشد. طول این انگل ممکن است به حدود ۷ سانتی‌متر (۲۴-۷۶ میلی‌متر) و عرض آن به ۵-۱۳ میلی‌متر برسد. فاصله آخرین بیضه از انتهای بدن در فاسیولا ژیگانتیکا بسیار طویل تر از فاصله مشابه در فاسیولا هیاتیکا است (۱۰).



شکل ۲- بالغ فاسیولا ژیگانتیکا

## ناقل

انواع حلزون‌های جنس لیمنه ناقلین مهم انگل‌های فاسیولاهستند. حساسیت حلزون‌های مختلف جنس لیمنه به انگل‌های فاسیولای موجود در ایران به وسیله محققین متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه این تحقیقات با نتایج متفاوتی همراه بوده است، ولی دیدگاه غالب بیانگر این است که حلزون لیمنه ژدروزیانا (*Lymnaea gedrosiana*) ناقل فاسیولاژیگانتیکا و حلزون لیمنه ترونکاتولا (*Lymnaea truncatula*) ناقل فاسیولاهپاتیکا می‌باشد.



شکل ۳- لیمنه ترونکاتولا ناقل فاسیولاهپاتیکا

بر این اساس نام واقعی حلزون لیمنه ژدروزیانا در حقیقت (*Radix auricularia*) و نام لیمنه ترونکاتولا (*Galba truncatula*) می‌باشد. به همین

دلیل در ادامه مطلب نام جدید این حلزون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (۱۵) - (۱).

حلزون‌های ناقل فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از نظر اکولوژیک با هم بسیار متفاوتند. آنهایی که فاسیولا هپاتیکا را منتقل می‌کنند گونه‌هایی هستند با تمایل دوزیست بودن و معمولاً به زندگی در منابع آبی کوچک و کم عمق عادت دارند. این شرایط معمولاً در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای گیلان فراهم است. آب‌های کم عمقی که از زمین می‌جوشند و در سطح آن جاری می‌شوند و غالباً تمیز و خنک می‌باشند محیط مناسبی برای حلزون لیمنه ترونکاتولا فراهم می‌کنند. این منابع آبی ممکن است فصلی و یا دائمی باشند. این حلزون‌ها گاهی در گل و لای نواحی مرطوب اطراف نهرها و چشمه‌ها یافت می‌شوند و می‌توانند برای مدت‌ها در این مناطق زنده بمانند.

ناقلین فاسیولا ژیگانتیکا حلزون‌هایی هستند که در منابع آبی بزرگتر و عمیق‌تر غنی از روئیدنی‌ها استقرار می‌یابند. این منابع آبی غالباً دائمی بوده و یا در ماه‌های زیادی از سال واجد آب می‌باشند. این حلزون‌ها دوزیست نبوده و وابستگی زیادی به وجود آب دارند. به عنوان مثال در استان گیلان چنین منابع آبی غالباً در مناطق پست و کم ارتفاع مشاهده می‌شود. به همین دلیل در اغلب نواحی مسطح گیلان این حلزون را می‌توان در منابع آبی دائمی و شالیزارها یافت نمود. این در حالی است که ناقل فاسیولا هپاتیکا به ندرت در این نواحی استقرار می‌یابد. مطالعات اخیر نشان داده است که حلزونی که از

نظر مورفولوژیک بسیار شبیه لیمنه ترونکاتولاست و در سطح وسیعی از مناطق مسطح در گیلان از جمله بندر انزلی وجود دارد. حلزونی به نام *Lymnaea schiraziensis* است که نقشی در انتقال فاسیولا هیپاتیکا ندارد. این موضوع با یافته‌های اشرفی و همکاران در خصوص احتمال بیشتر آلودگی‌های انسانی با فاسیولا ژیگانتیکا در نواحی آندمیک گیلان مطابقت دارد. بیش از ۹۰٪ دام‌های مناطق مسطح گیلان به فاسیولا ژیگانتیکا آلوده هستند در حالی که در مناطق کوهستانی بیش از ۹۵٪ دام‌ها به فاسیولا هیپاتیکا آلوده‌اند. بر این اساس انتظار می‌رود که غالب عفونت‌های انسانی در نواحی کوهستانی نیز مربوط به فاسیولا هیپاتیکا باشد.

بنابراین حتی در یک منطقه آندمیک واحد، کانون‌های انتقال این دو گونه فاسیولا (هیپاتیکا و ژیگانتیکا) متفاوت و غالباً جدای از هم می‌باشد. فاسیولیازیس ناشی از فاسیولا هیپاتیکا در مقایسه با فاسیولا ژیگانتیکا بیشتر به صورت فصلی است.

### مخزن

مخازن انگل در طبیعت حیواناتی از قبیل گوسفند، گاو، گاومیش، بز و سایر نشخوارکنندگان بزرگ می‌باشند. فاسیولا هیپاتیکا بیشتر به گوسفند و بز و فاسیولا ژیگانتیکا بیشتر به گاو و گاومیش گرایش دارند، با این وجود آلودگی‌های مخلوط این دو انگل در میزبانان فوق‌الذکر نیز به فراوانی

مشاهده شده است. همچنین در بعضی از مناطق دنیا که فاسیولیازیس هیبرآندمیک است و در جمعیت‌های انسانی از شیوع بالایی برخوردار است، انسان‌ها یک مخزن مهم برای این کرم محسوب می‌شوند و در انتقال عفونت نقش اساسی دارند (۱ و ۵ و ۶).

### انتشار جغرافیایی فاسیولیازیس در جهان

توانایی انگل‌های فاسیولا در کلونیزه شدن و تطابق در محیط‌های جغرافیایی جدید به عنوان یکی از عوامل مهم در انتشار فاسیولیازیس در مناطق مختلف جهان مطرح شده است. این بیماری به علت توانایی بسیار بالای عامل ایجادکننده و همچنین ناقلین آن در استقرار یافتن در موجودات و محیط‌های جدید، پتانسیل بالایی برای انتشار دارد. به همین علت فاسیولا هپاتیکا قادر بوده است تا از نواحی انتشار اولیه خود در اروپا همراه با انتقال دام‌ها به ۵ قاره جهان انتشار یابد و در این نواحی در پستانداران جدید تطابق یابد (مثلاً تطابق در شتر سانان آفریقا و آمریکای جنوبی و کیسه داران استرالیا). اثبات وجود این انگل در رات‌های سیاه (*Rattus rattus*) در جزیره Corsica در فرانسه، خوک در آمریکای جنوبی مثال‌های بسیار خوبی از توان تطابق انگل‌های فاسیولا می‌باشد. در تمامی این موارد میزبانان جدید نقش مهمی به عنوان مخزن ایفا نموده و در انتقال و انتشار فاسیولیازیس دخالت دارند (۴ و ۱۶). فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانیتیکا از نظر میزبان واسط اختصاصی می‌باشند و توانایی انگل‌های فاسیولا در تطابق در محیط‌های مختلف به میزان بسیار

زیادی به قدرت تطابق آنها در حلزون‌های ناقل دارد. این حلزون‌ها از نظر نیازمندی‌های اکولوژیک متفاوت می‌باشند و به همین دلیل انتشار انگل‌های فاسیولا در مناطق مختلف جهان بستگی زیادی به توانایی حلزون‌های میمنه در این نواحی دارد. به نظر می‌رسد که فاسیولا ژینگانتیکا از نظر جغرافیایی به مناطقی محدود باشد که گونه‌های Radix وجود دارند (غالب مناطق آفریقا و آسیا)، در مقابل فاسیولا هیپاتیکا در نواحی که حلزون‌های گروه Galba / Fossaria شایع می‌باشند، یعنی در تمامی قاره‌ها، دیده می‌شود (۴ و ۱۶).

#### نواحی آندمیک انسانی اصلی (Main human endemic areas)

مهم‌ترین مشکلات بهداشتی ناشی از انگل‌های فاسیولا در کشورهای حاشیه آند (Andean Countries) از جمله در بولیوی، پرو، شیلی و اکوادور، جزایر کارائیب (کوبا)، شمال آفریقا (مصر) اروپای غربی (پرتغال، فرانسه و اسپانیا) و سواحل دریای خزر (ایران و کشورهای همسایه) به چشم می‌خورد. از آنجایی که عفونت ممکن است بدون نشانه باشد و نشانه‌ها و علائم بیماری پاتوگنومونیک نیستند (یعنی علائم بالینی بیماری آنقدر اختصاصی نیستند که از روی آن بتوان بیماری را تشخیص داد)، تعداد واقعی موارد انسانی بیماری بدون شک بسیار بیشتر از موارد گزارش شده می‌باشد (۴ و ۱۶ و ۱۹).

## اروپا

در اروپا فرانسه یک منطقه آندمیک مهم است و اولین اپیدمی بزرگ فاسیولیازیس انسانی در سال ۱۹۵۶ در این کشور اتفاق افتاده است. بین سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۵۰ تعداد ۳۲۹۷ مورد بیماری در گزارشات منتشر شده، از این کشور بوده است. بیماری همچنین در پرتغال حائز اهمیت است. قسمت شمالی این کشور یک ناحیه آندمیک قابل توجه می‌باشد. در مقاله مروری Sampaio silva (1996) به تعداد ۱۰۱۱ مورد بیماری اشاره شده است که در سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۷۰ در آزمایشگاه پورتو تشخیص داده شده است. در اسپانیا موارد انسانی بیماری غالباً از نواحی شمالی کشور گزارش شده است و به نظر می‌رسد که موارد گزارش شده بیماری نشان‌دهنده تعداد واقعی موارد بیماری نیست و بسیار کم تخمین زده شده است. در انگلستان ۴۴ مورد بیماری (غالباً از سه منطقه) در نیمه اول سال ۱۹۶۹ گزارش شده است (۲۴-۲۰).

## آمریکا

در حالیکه در کشورهای آمریکای شمالی و مرکزی تعداد موارد بیماری بسیار کم است در کشورهای آمریکای جنوبی وضعیت متفاوتی به چشم می‌خورد. در آمریکای شمالی فاسیولیازیس انسانی در آمریکا و کانادا بسیار تک‌گیر است. در مکزیک ۵۳ مورد بیماری گزارش شده است. در آمریکای

مرکزی فاسیولیازیس انسانی یک مشکل مهم بهداشتی در جزایر کارائیب به حساب می‌آید و در رأس همه نواحی، پورتوریکو و کوبا حائز اهمیت می‌باشند. در کوبا موارد متعدد همه‌گیری فاسیولیازیس گزارش شده است که در طی آن هزاران نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند (۵). در آمریکای جنوبی فاسیولیازیس انسانی یک مشکل جدی در بولیوی، پرو و احتمالاً اکوادور می‌باشد. اگرچه در بولیوی موارد اسپورادیک بیماری در مناطق مختلف کشور شناخته شده می‌باشد، مناطق هیپراندمیک بیماری فقط به شمال بولیوی بین دریاچه Titicaca و دره شهر Lapaz در ارتفاع ۴۰۰۰-۳۸۰۰ متری محدود می‌گردد. در بعضی از جمعیت‌ها شیوع بیماری در بررسی‌های کوپرولوژیک (آزمایش نمونه‌های مدفوع) و سرولوژیک به ترتیب ۷۲٪ و ۱۰۰٪ گزارش شده است. تعداد افراد آلوده در حدود ۳۵۰۰۰۰ نفر و جمعیت در معرض خطر یک میلیون نفر تخمین زده شده است. در پرو موارد انسانی بیماری در تمام مناطق این کشور نشان داده شده است ولی در بعضی از مناطق به صورت مزواندمیک و هیپراندمیک می‌باشد. در بعضی جوامع روستایی تا ۵۰٪ افراد به این بیماری مبتلا می‌باشند. در اکوادور وضعیت مشابه با کشور پرو می‌باشد. بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت (۱۹۹۵)، حدود ۱٪ از کل جمعیت روستایی در مناطق آندمیک زندگی کرده و تعداد افراد آلوده در این منطقه ۲۰۰۰۰۰ نفر تخمین زده شده است. در شیلی فاسیولیازیس انسانی هیپواندمیک است. در آرژانتین، برزیل، اروگوئه، کلمبیا



و ونزوئلا فاسیولیازیس انسانی انتشار فوکال داشته و تک‌گیر است و تعداد موارد آلوده زیر ۱۰۰ مورد گزارش شده است (۲۹-۲۶).

### آسیا

در آسیا به دلیل روی هم افتادگی انتشار فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژینگانتیکا، با مشکل بیشتری مواجه هستیم. در بین کشورهای آسیایی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است و بر اساس شواهد موجود تعداد افراد آلوده در طول دو اپیدمی در استان گیلان در حدود ۱۵۰۰۰ نفر و در فاصله بین دو اپیدمی و پس از آن سالانه صدها مورد بوده است (۳۰ و ۳۱). در ویتنام تا قبل از سال ۱۹۹۷ فاسیولیازیس انسانی تنها به صورت تک‌گیر گزارش شده است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ افزایش ناگهانی در تعداد موارد بیماری، فاسیولیازیس را در این کشور به یک بیماری نوپدید بدل کرد. در ۸ ماهه اول سال ۲۰۰۶ تعداد موارد گزارش شده آن حدود ۲۰۰۰ مورد بوده است. هر چند که فاسیولیازیس انسانی در سراسر این کشور وجود دارد، ولی بیشترین موارد بیماری از نواحی مرکزی آن گزارش شده است. در حال حاضر برنامه کنترل بیماری در ویتنام به شیوه بیمار یابی غیر فعال در حال انجام است (۳۲). تعداد موارد بیماری در کشورهایی چون کامبوج، عراق، لبنان، نپال، فیلیپین و سوریه بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت زیر ۱۰۰ نفر بوده است (۲۵).

### آفریقا

در این قاره بیشترین موارد انسانی بیماری از مصر گزارش شده است و احتمالاً فاسیولا ژیکانتیکا انگل غالب در عفونتهای انسانی است. در طول چند سال اخیر فاسیولیازیس بعنوان یک مشکل بهداشتی نوظهور در مصر بروز نموده است. شیوع عفونت در بعضی از نواحی آندمیک روستایی بین ۱۷-۷٪ بوده و تعداد افراد آلوده حداقل ۸۳۰۰۰۰ نفر و جمعیت در معرض خطر ابتلا به فاسیولیازیس ۲۷/۷ میلیون نفر تخمین زده شده است (۱ و ۴).

### اقیانوسیه

در اقیانوسیه علیرغم تولید قابل توجه دام و شیوع بالای عفونت در گوسفندان و گاوها، تنها ۱۲ مورد انسانی بیماری از استرالیا گزارش شده است (۷ و ۳۳).

### انتشار فاسیولیازیس در جمهوری اسلامی ایران

در ایران فاسیولیازیس حیوانی تاریخچه‌ای طولانی داشته و همواره به عنوان یک مشکل مهم دامپزشکی مورد توجه قرار داشته است. براساس نتایج مطالعات مختلف در گذشته، آلودگی دامها به فاسیولا در بعضی نقاط ایران بسیار شدید بوده است. در مطالعه صباغیان در سال ۱۳۴۳ در دزفول (خوزستان) ۳۱٪ دامها آلوده به این انگل بوده اند و مطالعه صهبا و همکاران نیز در استان خوزستان آلودگی بالایی در گاو و گاو میشها نشان داده است

و همچنین طبق مطالعه انجام شده در سال ۱۳۴۱ در استان‌های گیلان و مازندران شدت آلودگی در دام‌ها به ترتیب ۲۱/۵ و ۱۲ درصد بوده است در برخی مطالعات در استان خوزستان علاوه بر فاسیولا هپاتیکا، آلودگی به فاسیولا ژیگانتیکا نیز در بین گوسفندان ۲۷٪ در بزها ۱۰/۵ درصد و در گاوها ۴۷ درصد و در گاو میش ۹۱/۴ درصد گزارش شده است (سال ۱۳۵۱) شیوع کلی آلودگی دام‌ها در ایران بین ۲۰-۳۰ درصد بوده و بیش از همه در گاو میش، گاو، گوسفند و بز دیده می‌شود (۳۴ و ۳۵).

اولین مورد انسانی بیماری در ایران در سال ۱۳۳۴ تشخیص داده شد. از آن زمان سالانه موارد معدودی از بیماری در استانهای مختلف (به‌ویژه استان‌های گیلان، مازندران، کرمانشاه و اصفهان) گزارش شده است. در استان گیلان دو همه‌گیری بزرگ انسانی در سال ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸ به‌وقوع پیوست و در این همه‌گیریها بیش از ۱۰۰۰۰ نفر به این بیماری مبتلا شدند (عمدتاً در شهرهای رشت و بندرانزلی). لازم به ذکر است که در فاصله این دو همه‌گیری و پس از آن هر ساله صدها نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که فاسیولیازیس در این منطقه به صورت بومی درآمده باشد (۳۰).

ویژگی‌های استان گیلان از جمله میزان بارندگی بالا که چندین برابر میانگین کشوری آن است، درجه حرارت و رطوبت مناسب، وجود منابع آبی و کانال‌های کشاورزی، وجود شالیزارهای وسیع و دامهای رها در منطقه، تراکم جمعیت بالا، وجود سبزیجات آبیزی معطر وحشی در اکثر مناطق استان و

عادت جمعیت‌های ساکن در منطقه در خوردن این قییل سبزیجات به صورت خام در استقرار بیماری در این منطقه از کشور دارای اهمیت زیادی می‌باشد.

در مناطق جلگه‌ای اطراف دریای خزر فاسیولیاژیس ناشی از فاسیولا ژیگانتیکا شایع‌تر بوده (بخصوص در گاوها) در حالی که در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای، فاسیولیاژیس حیوانی عمدتاً به وسیله فاسیولا هیپاتیکا ایجاد می‌شود و مخازن اصلی آن گوسفند و بز می‌باشند. همانند آنچه که در اکثر نواحی آفریقا و آسیا به چشم می‌خورد، در ایران نیز انتشار هر دو گونه انگل فاسیولا با یکدیگر همپوشانی دارند و این موضوع تعیین هویت انگل در گیر در عفونت‌های انسانی را با مشکل مواجه کرده است. تا کنون سه گونه از حلزون‌های لیمنه در استان گیلان تعیین هویت شده‌اند و بر اساس نتایج مطالعات به عمل آمده، حلزون *Radix auricularia* ناقل فاسیولا ژیگانتیکا غالباً در مناطق جلگه‌ای و کم ارتفاع و *Galba truncatula* ناقل فاسیولا هیپاتیکا در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای استان انتشار دارند. انتشار این حلزون‌های ناقل با انتشار انگل‌های فاسیولا در استان گیلان هماهنگی کامل دارد (۳۶).

اگر چه موارد بیماری فاسیولیاژیس از سراسر مناطق حاشیه دریای خزر گزارش شده است، ولی بیشترین موارد آن مربوط به استان گیلان می‌باشد. فاسیولیاژیس در اکثر نواحی آندمیک دنیا یک بیماری روستایی است و

کشاورزان و دامداران را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد ولی در نواحی آندمیک استان گیلان بیشترین موارد بیماری از مناطق شهری گزارش شده است. با توجه به اینکه شرایط اپیدمیولوژیک انتقال بیماری در نواحی شهری به طور کامل فراهم نیست، به نظر می‌رسد که منشأ موارد فاسیولیاژیس در شهرهای رشت و انزلی از کانونهای روستایی اطراف و از طریق فروش سبزیجات جمع‌آوری شده از نواحی روستایی توسط روستاییان و فروش آن در شهرها باشد. مطالعات به عمل آمده توسط اشرفی و همکاران در شهرستان بندر انزلی در ۲-۳ سال اخیر بیانگر این واقعیت است که میزان شیوع واقعی فاسیولیاژیس در جمعیت‌های انسانی ساکن در منطقه کمتر از ۱٪ بوده و فاسیولیاژیس انسانی در این منطقه در سطح هیپوآندمیک است.


از آنجایی که بر اساس شواهد موجود پتانسیل وقوع مجدد همه‌گیری‌های انسانی در استان گیلان وجود دارد، سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۸ ایران را در زمره ۶ کشور دنیا که مشکل جدی فاسیولیاژیس دارند طبقه‌بندی کرده است (۳۲).

در سال ۲۰۰۴ صلاحی مقدم و همکاران ۱۰۷ مورد انسانی را از استان مازندران گزارش کردند. این موارد در فاصله سال‌های ۲۰۰۲-۱۹۹۹ رخ داده‌اند. غالب این موارد در نواحی غربی استان مازندران (شرق استان گیلان) رخ داده است که نشان دهنده قرابت شرایط محیطی و انتقال در این دو منطقه

است (۳۷). مواردی از بیماری از استان‌های کرمانشاه، اردبیل و فارس نیز گزارش شده است.

### سیر تکامل انگل‌های فاسیولا

انگل‌های فاسیولای بالغ در مجاری صفراوی بزرگ و کیسه صفراوی میزبانان نهایی، عمدتاً حیوانات نشخوارکننده، زندگی می‌کنند. تخم‌هایی که به وسیله ترماتودهای موجود در مجاری صفراوی تولید می‌شوند، همراه با جریان صفرا و از طریق مجرای کلدوک به روده میزبان رسیده و همراه با مدفوع آن دفع می‌گردند. انگل دارای یک چرخه زندگی آبی است و تخم‌های فاسیولا که در موقع دفع نارس می‌باشند، فقط در صورت رسیدن به آب تکامل می‌یابند (شکل ۴).



شکل ۴- تخم فاسیولا

در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی ( $15-25^{\circ}\text{C}$ )، در مدت ۹-۲۱ روز در داخل تخم یک جنین مژه دار به نام میراسیدیوم (Miracidium) تکامل می‌یابد. در صورت نامساعد بودن شرایط، تکامل تخم متوقف می‌شود، ولی این تخم‌ها قادرند به مدت چندین ماه قدرت حیات خود را حفظ کنند. میراسیدیم در اثر تحریک نوری از تخم خارج می‌شود و به وسیله مژه‌های خود به سرعت در آب شنا می‌کند، تا اینکه خود را به حلزون میزبان واسط مناسب برساند. انواع حلزونهای جنس لیمنه ناقلین مهم انگل‌های فاسیولا می‌باشند. در صورتیکه میراسیدیم به حلزون میزبان واسط خود نرسد؛ در مدت ۲۴ ساعت خواهد مرد. میراسیدیم پس از نفوذ در بدن حلزون، به یک جسم کیسه‌ای شکل به نام اسپوروسیست (Sporocyst) تغییر شکل می‌یابد. در این اسپوروسیست شکل دیگری از انگل به نام ردی (Redia) به وجود می‌آید (شکل ۵).



شکل ۵- ردی بالغ فاسیولا

ردی‌ها از اسپوروسیست خارج می‌شوند و عمدتاً به غدد هاضمه مهاجرت می‌کنند. در داخل ردی مرحله لاروی دیگری به وجود می‌آید که سرکر (Cercariae) نامیده می‌شود. تکامل سرکر در داخل ردی در درجه حرارت  $20^{\circ}\text{C}$ – $25^{\circ}\text{C}$ ، حدود ۶–۷ هفته به طول می‌انجامد؛ در حالیکه در درجه حرارت پایین این تکامل به تأخیر خواهد افتاد. سرکر دارای یک سر بزرگ تقریباً گرد و یک دم طویل ساده و متحرک است. فرایند سرکرگذاری در درجه حرارت ۹–۲۶ درجه سانتی‌گراد صورت می‌گیرد و مستقل از نور و یا تاریکی است، ولی به نظر می‌رسد که بیشترین میزان تولید سرکر بین نیمه شب و ساعت ۱ بامداد صورت می‌گیرد (شکل ۶).




شکل ۶- سرکر فاسیولا



سرکر به مدت کوتاهی شنا کرده تا اینکه به یک سطح جامد، که غالباً برگ‌های گیاهان آبی می‌باشد، اتصال پیدا می‌کند، ابتدا در اطراف سر خود یک غشاء محافظ به وجود می‌آورد، سپس دم خود را از دست می‌دهد و سریعاً آنکیسته می‌شود و به فرمی به نام متاسرکر (Metacercariae) تغییر شکل می‌یابد (۱۰ و ۳۸).

متاسرکرها گرد بوده و حدود ۲۰۰ میکرون قطر دارند و ۲۴ ساعت پس از تشکیل، عفونت‌زا می‌باشند. متاسرکهای شناور که در سطح آب تشکیل می‌شوند، نیز قدرت آلوده‌کنندگی دارند و نقش مهمی در آلوده کردن میزبانان نهایی، به دنبال نوشیدن آب آشامیدنی آلوده، خواهند داشت. متاسرکرها بسیار مقاومند و برای مدت طولانی زنده باقی خواهند ماند، اما در مقابل گرما و خشکی زیاد کشته می‌شوند. عفونت انسان و سایر میزبان نهایی به دنبال خوردن متاسرکر اتفاق می‌افتد. نمای کلی چرخه زندگی انگل‌های فاسیولا در شکل ۷ قابل مشاهده است.



شکل ۷- نمای کلی چرخه زندگی انگل‌های فاسیولا

### چگونگی ابتلای انسان به فاسیولیاژیس

آلودگی انسان و سایر میزبانان به انگل فاسیولا به دنبال خوردن متاسرکرهای عفونت زارخ می‌دهد و عفونت زایی متاسرکرها نیز بستگی به طول عمر آنها دارد. هرچه طول عمر متاسرکر بیشتر باشد قدرت عفونت‌زایی آن کمتر است. از آنجایی که این متاسرکرها غالباً چسبیده به برگ گیاهان آبی و یا به صورت شناور بر آب وجود دارند، فاسیولیاژیس هم جزء بیماری‌های منتقله به وسیله غذا و هم بیماری‌های منتقله توسط آب طبقه‌بندی می‌شود.

منابع آلودگی متفاوتی برای این انگل پیشنهاد شده است که به‌طور خلاصه عبارتند از (۱ و ۴):

#### ۱- خوردن گیاهان وحشی آب شیرین

این قبیل گیاهان یکی از مهم‌ترین منابع عفونت‌های انسانی در مناطقی است که فاسیولیازیس حیوانی آندمیک است. گونه‌های مختلف گیاهان آب شیرین بر حسب عادات غذایی و ذائقه در نواحی مختلف جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. غالب گزارشات موارد انسانی فاسیولیازیس مرتبط با watercress است. این اصطلاح در برگیرنده گونه‌های مختلف گیاهان آبی است.

#### ۲- خوردن گیاهان آبی پرورشی

در برخی از نواحی دنیا ممکن است بعضی از گونه‌های گیاهی آنقدر در رژیم غذایی انسان حائز اهمیت باشند که در سطح خانواده و یا صنعتی کشت داده شوند و در بازارهای عمومی به فروش برسند. این موضوع می‌تواند توضیحی باشد برای عفونت افرادی که دور از نواحی آندمیک زندگی می‌کنند.

#### ۳- خوردن گیاهان وحشی خشکی زی

توانایی بقای طولانی مدت و مقاومت متاسرکر انگل در مقابل خشکی توضیحی برای عفونت‌های انسانی که به دنبال خوردن گیاهان خشکی زی وحشی جمع آوری شده از نواحی خشک که چند هفته یا چند ماه قبل زیر آب قرار داشته‌اند، می‌باشد.

**۴- خوردن گیاهان خشکی زی پرورشی**

ویژگی دوزیست بودن لیمنه ترونکاتولا، ناقل فاسیولا هپاتیکا، سبب شده است تا در مناطق کاشت گیاهان غیر آبی که نیاز به آبیاری فراوان دارند، کانون‌هایی از فاسیولیازیس به وجود آید. این قبیل گیاهان که غالباً از مناطق آندمیک روستایی به نواحی شهری منتقل و به شکل کنترل نشده به فروش می‌رسند، منجر به عفونت‌های شهری می‌شوند.

**۵- خوردن غذاهای سنتی که از سبزیجات محلی تهیه می‌شوند.**

در نواحی آندمیک فاسیولیازیس در سواحل بحر خزر انواع متنوعی از گیاهان آبی معطر به شکل وحشی رشد می‌کنند که جایگاه ویژه‌ای در رژیم غذایی ساکنین این مناطق دارند. این گیاهان آبی نه تنها به صورت خام همراه با غذا به مصرف می‌رسند بلکه در مواردی نیز در تهیه بعضی خوراکی‌های محلی کاربرد دارند. از این خوراکی‌ها می‌توان به زیتون پرورده و دلار اشاره کرد. اشرفی و همکاران نشان دادند که در صورت آلوده بودن سبزیجات مورد استفاده به متاسرکر فاسیولا، امکان انتقال بیماری به انسان وجود دارد. موارد مشابهی از غذاهای محلی در مناطق دیگر جهان از جمله پرو وجود دارد.

**۶- نوشیدن آب آلوده به متاسرکر**

آب نیز به عنوان یکی از منابع عفونت‌های انسانی مطرح می‌باشد. در مناطق مرتفع بولیوی ۱۳٪ متاسرکرها به شکل شناور در آب می‌باشند. خوردن آبهای سطحی واجد متاسرکر به ویژه در مناطق کوهستانی (چشمه‌های رو باز)

می‌تواند منجر به فاسیولیاژیس شود. بدیهی است منشأ برخی عفونت‌های انسانی در افرادی که از سبزی خام استفاده نمی‌کنند، ممکن است با نوشیدن آب‌های آلوده به متاسرکر مرتبط باشد.

#### ۷- خوردن غذاها و سوپ‌های تهیه شده با آب آلوده (در صورت تهیه با حرارت پایین)

آب‌های آلوده به متاسرکر همچنین ممکن است سبب آلودگی مواد غذایی شود که در این آب‌ها شسته می‌شوند. شستشوی سبزیجات مورد استفاده در سالاد در آب‌های واجد متاسرکر منجر به ایجاد عفونت‌های انسانی شده است. گزارشاتی در این مورد وجود دارد.

#### ۸- شستشوی وسایل آشپزخانه و سایر وسایل در آب‌های آلوده

شستشوی ظروف آشپزخانه در آب‌های واجد متاسرکز می‌تواند سبب عفونت‌های انسانی شود. مواردی از این شیوه آلودگی در مصر که زنان ظروف آشپزی خود را در کانال‌های کشاورزی واجد حلزون ناقل می‌شویند گزارش شده است.

#### ۹- خوردن کبد خام

نتایج مطالعات اخیر نشان می‌دهد که مصرف کبد خام واجد مراحل غیر بالغ (نوزاد) انگل‌های فاسیولا ممکن است به فاسیولیاژیس منجر شود. لازم به ذکر است که خوردن کبد‌های واجد مراحل بالغ انگل سبب عفونت در انسان نمی‌شوند.

### راه‌های احتمالی انتقال عفونت در مناطق آندمیک ایران

با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد که مصرف گیاهان آبرزی وحشی و همچنین گیاهان خشکی زی وحشی که با توجه به شرایط محیطی برای مدتی در آب غوطه‌ور بوده‌اند، نقش اصلی را در انتقال فاسیولیازیس در مناطق آندمیک کشور ما ایفا نماید. از طرف دیگر تهیه خوراکی‌های مختلف با سبزیجات خام، همانند دلار و زیتون پرورده در استان گیلان، می‌تواند در انتقال عفونت به ساکنین مناطق آندمیک یا حتی بسیار دورتر از آن نقش داشته باشد. این خوراکی‌ها حتی در مواردی به خارج از کشور نیز ارسال می‌شوند.

گیاهان آبرزی معطر متعددی در استان گیلان وجود دارد که به صورت خودرو در سطح وسیعی از استان پرورش می‌یابند. این سبزیجات معطر که جایگاه ویژه‌ای در رژیم غذایی مردم منطقه دارند در تمامی طول سال به وسیله روستاییان از نواحی روستایی جمع‌آوری و در سطح شهرها به فروش می‌رسند. از آنجایی که در محل‌های پرورش این گیاهان دام‌های آلوده و حلزون‌های ناقل هر دو یافت می‌شوند، امکان برقراری چرخه زندگی انگل و آلودگی آن‌ها با متاسرکر فاسیولا دور از انتظار نیست. از جمله این گیاهان می‌توان به چوچاق (*Eringium cucasicum*)، خالیواش (*Mentha pulegium*) و نعناعی محلی (*Mentha piperita*) اشاره نمود.

در برخی از مناطق کشور گیاهی با نام محلی *بولغخ اوتی* نیز به فراوانی به مصرف می‌رسد که ممکن است در انتقال بیماری نقش داشته باشد. در مناطق آندمیک کنگاور در استان کرمانشاه گیاهی آبری با نام محلی *بلمک* با برگ‌های پهن وجود دارد که کاملاً آبری بوده و ریشه آن در داخل آب فرو رفته و برگ‌های آن بر روی سطح آب شناور می‌شود به نحوی که متاسرکر انگل می‌تواند به راحتی به سطح زیرین برگ این گیاه متصل شود. به طور کلی هر گونه گیاه آبری یا نیمه آبری خودرو که در سبد غذایی ساکنین مناطق آندمیک بیماری قرار گیرد می‌تواند در انتقال فاسیولیاژیس به جمعیت‌های انسانی نقش داشته باشد. انواع متنوعی از این گیاهان در مناطق مختلف دنیا معرفی شده‌اند (۳۸). به‌طور کلی انسان بیشتر از راه خوردن سبزی‌های خام و سالاد، آلوده می‌شود (ارفع).

نوشیدن آب‌های آلوده سطحی (چشمه‌های روباز مناطق کوهستانی) نیز می‌تواند در انتقال فاسیولیاژیس به روستاییان ساکن در این مناطق نقش داشته باشد. غالب روستاییان ساکن در کوهپایه‌ها در فصل تابستان با دام‌های خود به نواحی مرتفع مهاجرت می‌کنند. بطور کلی وجود حلزون ناقل، دام آلوده و منابع آبی مناسب شرایط را برای انتقال بیماری در این نواحی تسهیل می‌کند. از نقش جگر خام یا کم پخته واجد مراحل لاروی یا نوزادی انگل نیز نباید چشم پوشی کرد. خوردن جگر خام، آب آلوده و خوراکی‌های تهیه شده با

سبزیجات خام (دلار) می‌تواند توجیهی برای عفونت کسانی باشد که عادت به خوردن سبزی خام ندارند.



## فصل دوم

### مراقبت بالینی و درمان فاسیولیاژیس

## بیماری زایی و تظاهرات بالینی

به عقیدهٔ عموم محققین، انسان میزبان مناسبی برای انگل‌های فاسیولا نیست و اکثر ترماتودهای در حال مهاجرت در پارانشیم کبد به دام می‌افتند و قبل از رسیدن به مجاری صفراوی از بین می‌روند. هنگامی که انگل به پارانشیم کبد وارد و از بافت کبد و خون تغذیه می‌کند، مرحله حاد بیماری آغاز می‌شود. پاتوژنز بستگی به تعداد ترماتودهایی دارد که از دیوارهٔ روده می‌گذرند و به کبد تهاجم می‌نمایند. مهاجرت انگل از پارانشیم کبد به سمت مجاری صفراوی که ۴-۶ هفته یا بیشتر به طول می‌انجامد و با تخریب وسیع بافت پارانشیم کبد، خونریزی و پاسخ‌های آماسی ناشی از مرگ انگل همراه است، منجر به ایجاد پاتولوژی شدید می‌شود.

ترماتودها ممکن است به مجاری صفراوی برسند و برای سال‌ها در آنجا زندگی کنند. در این مرحله از بیماری که فاز مزمن نامیده می‌شود، اثرات پاتولوژیک از شدت کمتری برخوردار است. پاسخ‌های آماسی، انسداد مجاری و فعالیت پرولین (proline) که در مقادیر زیاد به وسیلهٔ انگل ترشح می‌شود، منجر به تغییرات بافتی همچون اتساع و فیروز مجاری صفراوی می‌شود. کم‌خونی ممکن است در نتیجه حذف خون از ضایعات مجاری صفراوی به وجود آید. همچنین دیوارهٔ کیسهٔ صفرا به میزان زیادی ضخیم و ادم‌دار می‌شود. مرگ ناشی از فاسیولیاژیس شایع نیست، اما معمولاً به دنبال خونریزی از مجاری صفراوی و در غالب موارد در کودکان دیده می‌شود.

بنابراین مهم‌ترین پیامد پاتوژنیک فاسیولیازیس ضایعات کبدی و فیروز و آماس مزمن مجاری صفراوی است (۴ و ۱۰).

### مراحل کلینیکی مختلف در افراد آلوده به فاسیولیازیس:

#### ۱- دوره کمون (Incubation period)

دوره کمون که از زمان خورده شدن متاسرکر تا ظهور اولین نشانه بیماری را شامل می‌شود، هنوز دقیقاً مشخص نیست و ممکن است از چند روز تا چند ماه و بطور معمول چند هفته تا چند ماه و حتی بیشتر به طول بیانجامد.

#### ۲- مرحله حاد (Acute phase)

در مرحله مهاجرت انگل از پارانشیم کبد نشانه‌های بیماری عمدتاً به علت تخریب مکانیکی بافت پارانشیم و واکنش‌های سمی و آلرژیک انگل ایجاد می‌شود و ممکن است ۲-۴ ماه طول بکشد. نشانه‌های اصلی بیماری در این مرحله شامل تب گاهی همراه با لرز و عرق، دردهای شکمی به ویژه در ناحیه فوقانی سمت راست شکم و گاهی با انتشار به شانه راست (دردهای RUQ)، اختلالات گوارشی، نشانه‌های آلرژیک (همچون کهیر و خارش) و نشانه‌های تنفسی می‌باشند. علائم معمول شامل بزرگی کبد و گاهی طحال، آسیت، کم خونی، علائم ریوی و یرقان است. در نواحی آندمیک فاسیولیازیس انسانی، عفونت مجدد به فراوانی اتفاق می‌افتد و ضایعات حاد بر ضایعات مزمن سوار می‌شود، بنابراین مرحله حاد ممکن است طولانی شود و

ممکن است با مرحله تأخیری و یا فاز انسدادی همپوشانی داشته باشد (۴ و ۱۰). در این مرحله ائوزینوفیلی به صورت یک علامت مشخص ممکن است وجود داشته باشد.

### ۳- مرحله تأخیری (Latent phase)

این مرحله شامل بلوغ انگل و آغاز تخم‌گذاری است و ممکن است برای ماه‌ها و یا سال‌ها به طول بیانجامد. نسبت افراد بدون نشانه در این مرحله مشخص نیست و اغلب در طول غربال خانواده‌ها و به منظور تشخیص یک بیماری دیگر آشکار می‌شود. یک ائوزینوفیلی مشخص و بدون علت مشخص ممکن است پیشنهادکننده یک عفونت کرمی باشد. تشخیص عفونت ممکن است به دنبال شک کلینیکی یا بررسی اپیدمیولوژیک و با یافتن تخم‌های انگل در مایع دئودنوم یا مدفوع تأیید شود. در طول این مرحله افراد آلوده ممکن است از اختلالات گوارشی شکایت داشته و نشانه‌های مرحله حاد یک یا چند بار عود نماید (۴ و ۱۰).

### ۴- مرحله انسدادی (Chronic or obstructive phase)

این مرحله از بیماری ممکن است ماه‌ها و یا سال‌ها بعد از عفونت اولیه ظاهر شود. کرم‌های بالغ سبب آماس و هیپرپلازی اپیتلیوم مجاری صفراوی می‌شوند. اتساع مجاری و ضخیم شدن دیواره کیسه صفرا پیامدهای بعدی می‌باشند. ایجاد التهاب در مجاری صفراوی و کیسه صفرا به همراه پیکر بزرگ ترماتودها می‌تواند سبب انسداد مکانیکی مجاری صفراوی شود.

در این فاز از بیماری، قولنج‌های صفراوی، درد اپی گاستر، عدم تحمل غذای چرب، تهوع، یرقان، خارش، حساسیت شکم در ناحیه فوقانی سمت راست از تظاهرات کلینیکی هستند. بزرگی کبد ممکن است همراه با بزرگی طحال و یا آسیت باشد. در صورت وجود انسداد، کیسه صفرا معمولاً بزرگ و ادم دار بوده و دیواره آن ضخیم است. وجود سنگ‌های معمولاً کوچک و متعدد در مجاری صفراوی و کیسه صفرا شایع می‌باشد (۴ و ۱۰).

#### فاسیولیاژیس نابجا (Ectopic fascioliasis)

ترماتودهای نابالغ ممکن است در مسیر مهاجرت به سمت کبد، سرگردان شده و به سایر ارگان‌ها وارد شوند. استقرار انگل‌های فاسیولا در مناطق دیگر بدن غیر از کبد، فاسیولیاژیس نابجا نامیده می‌شود. در انسان شایعترین محل تشکیل ضایعات اکتوپیک مجرای گوارشی می‌باشد. سایر مناطق اکتوپیک شامل بافت‌های زیر جلدی، قلب، عروق خونی، حفره جنب، مغز، حلقه چشم، دیواره شکم، آپاندیس، پانکراس و طحال می‌باشند. این ترماتودهای سرگردان غالباً به بلوغ نمی‌رسند. مهاجرت انگل سبب ایجاد اثرات پاتولوژیک به صورت ضایعات بافتی ملتهب و فیروزه می‌شود.

از جنبه پاتولوژیک، ارتباط بین فاسیولیاژیس با عفونت ناشی از سایر پاتوژن‌ها بسیار مهم است. به دنبال عفونت فاسیولیاژیس پاسخ‌های ایمنولوژیک به آنتی‌ژن‌های پاتوژن به میزان زیادی فروکش می‌کند این موضوع سبب

می‌شود که عفونت‌های کرمی و تک یاخته‌ای همراه فاسیولیاژیس، شدیدتر  
تظاهر پیدا نمایند (۴ و ۱۰).

### تشخیص فاسیولیاژیس

#### الف - تشخیص بالینی (Clinical diagnosis)

تظاهرات کلینیکی ممکن است در تشخیص فاسیولیاژیس مهم باشند. در  
مناطق آندمیک شناخته شده، فاسیولیاژیس به فراوانی در تشخیص افتراقی با  
سایر بیماری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالیکه در مناطقی که  
فاسیولیاژیس به ندرت گزارش شده و یا وجود ندارد، پزشکان ممکن است  
این تشخیص احتمالی را مد نظر قرار ندهند.

بزرگی کبد، درد در ناحیه هیپوکندر راست، تب با منشأ ناشناخته، تاریخچه  
مصرف سبزیجات خام، سابقه فامیلی فاسیولیاژیس به همراه یافته‌های  
غیرمعمول آزمایشگاهی چون اتوزینوفیلی بالا همراه با لکوسیتوز یا بدون  
آن و ESR متوسط تا خیلی بالا میتواند پیشنهاد کننده بیماری باشد.

#### ب- تشخیص آزمایشگاهی (Laboratory diagnosis)

##### ۱- آزمایش مدفوع

روش اصلی تشخیص، یافتن تخم‌های انگل در مدفوع یا در مایع حاصل از  
توباژ اثنی عشر (دئودنوم) است. برای تشخیص فاسیولیاژیس مزمن  
تکنیک‌های مختلفی چون یک اسمیر مستقیم ساده تا روش‌های مختلف

تغلیظ به کار برده شده‌اند. به نظر می‌رسد که روش‌های تغلیظ رسوبی مانند فرمالین-آتر و تلمن روش‌های مناسبی برای یافتن تخم فاسیولا در مدفوع بیماران باشند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت رسوب دادن مدفوع بیمار در ظروف مخروطی پایه‌دار (cup sedimentation) در مقایسه با روش فرمالین-آتر از حساسیت بالاتری برخوردار است ولی وقت گیر می‌باشد.

روش ساده و ارزان کاتو (Kato-Katz) نیز در تشخیص فاسیولیاژیس به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است. کاتو یک روش اختصاصی به ویژه برای شمارش تعداد تخم در گرم مدفوع بوده ولی غیر حساس است و تنها قادر است حدود ۳۰٪ مواردی که با روش‌های سرولوژی معتبر مثبت می‌شوند را تشخیص دهد، بنابراین برای افزایش حساسیت آن انجام بیش از یک آزمایش بر روی هر نمونه مدفوع ضروری است. با این حال تکنیک کاتو-کتر بهترین روش برای مطالعات اپیدمیولوژیک در مقیاس وسیع میدانی می‌باشد (۳۲ و ۳۸). این روش تشخیصی قادر به تشخیص عفونت در دوره نهفتگی و فاز حاد بیماری نمی‌باشد و این بدین معناست که بیماری به راحتی در ۳-۴ ماه اول مورد غفلت قرار می‌گیرد. در ضمن موارد اکتوپیک بیماری نیز با این روش تشخیص داده نمی‌شود. از طرف دیگر عقیده عمومی بر این است که انسان میزبان مناسبی برای انگل‌های فاسیولا نیست و احتمال عفونت کبدی به وسیله ترماتودهایی که قادر به رسیدن به بلوغ جنسی نیستند را نباید

از نظر دور داشت. در افرادی که ترماتودها در بدن آنها به بلوغ نمی‌رسند، تخم‌های انگل هرگز یافت نمی‌شوند.

افرادی که در یک فاصله زمانی کوتاه قبل از انجام آزمایش (چند ساعت تا چند روز) از کبد آلوده (دارای کرم بالغ فاسیولا) تغذیه کرده باشند، ممکن است در مدفوع خود تخم فاسیولا دفع کنند. در این گونه موارد بیمار باید تحت رژیم غذایی عاری از کبد قرار گرفته و چند بار آزمایش مدفوع با فواصل مناسب از او به عمل آید. بنابراین تشخیص عفونت واقعی فاسیولیاژیس از عفونت کاذب (دفع تخم‌های خورده شده موجود در کبد دام‌ها) از اهمیت زیادی برخوردار است و از گزارش موارد مثبت کاذب جلوگیری به عمل می‌آورد (۱۰).

## ۲- روش‌های سرولوژی

تست‌های سرولوژیک در طول تمام مراحل بیماری و به خصوص در مرحله حاد و همچنین در سایر شرایطی که کاربرد روش‌های بررسی مدفوع با مشکلاتی مواجه است؛ قابل استفاده می‌باشند.

در طول دو دهه گذشته با تکامل تکنولوژی‌های جدید، تست‌های سرولوژیک مختلفی هم در عفونت‌های تجربی و هم در انسان، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تست‌ها شامل فیکساسیون کمپلمان (CF)، روش ایمونو فلورسانت (IFA)، کانتر الکتروفورز (CEP)، هماگلوتیناسیون غیرمستقیم (IHA) و الایزا (ELISA) می‌باشند.



کاربرد فرآورده‌های سوماتیک و دفعی - ترش‌حی تخلیص شده از کرم‌های فاسیولاهپاتیکای بالغ به عنوان آنتی ژن، در تست ELISA بیشترین حساسیت و ویژگی را نشان داده است. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، تست‌های سرولوژیک Fas2-ELISA و CL1-ELISA توانایی ردیابی آنتی بادی‌های در گردش (circulating IgG) که بر علیه آنتی ژن‌های Fas2 و CL1 مترشح از کرم‌های بالغ و نوزاد انگل‌های فاسیولا تولید شده‌اند، را دارند. این روش‌ها قادر به تشخیص عفونت در مراحل حاد و مزمن عفونت و همچنین فاسیولیزیس نابجا می‌باشند. به نظر می‌رسد که سطوح آنتی بادی‌های در گردش در تست‌های ELISA پس از درمان موفق بیماران، احتمالاً برای مدت‌ها بالا باقی می‌ماند و سریعاً سقوط نمی‌کند، بنابراین، این تست‌ها عفونت‌های فعال و غیرفعال را از هم متمایز نمی‌کنند و در ارزیابی موفقیت پس از درمان نیز چندان مفید نیستند.

این تست‌ها همچنین قادر به تشخیص آنتی ژن‌های اختصاصی انگل‌های فاسیولا در نمونه‌های سرم و مدفوع افراد آلوده می‌باشند. از این آنتی ژن‌ها می‌توان به آنتی ژن‌های دفعی ترش‌حی فاسیولا (FES-Ag) اشاره نمود. این تست‌ها که متأسفانه به طور روتین در دسترس نمی‌باشند، در ارزیابی موفقیت پس از درمان بسیار مفید می‌باشند (۱۰ و ۳۲ و ۳۸).

نتایج آزمایشات مدفوع و سرولوژی در حالات مختلف عفونت ممکن است به شرح ذیل باشد (۳۸):

- ۱- آزمایش مدفوع (-) سرولوژی (-)  $\Leftrightarrow$  عدم وجود عفونت و یا عفونت وجود داشته ولی برطرف شده است.
- ۲- آزمایش مدفوع (-) سرولوژی (+)  $\Leftrightarrow$  عفونت حاد یا نابجا (اکتوپیک)، عفونت وجود داشته ولی برطرف شده است، انسداد مجاری صفراوی، دفع متناوب تخم.
- ۳- آزمایش مدفوع (+) سرولوژی (+)  $\Leftrightarrow$  وجود انگل در کبد (عفونت کبد)
- ۴- آزمایش مدفوع (+) سرولوژی (-)  $\Leftrightarrow$  عفونت مزمن کبدی

### یافته‌های آزمایشگاهی مهم در تشخیص فاسیولیاژیس

یافته‌های خون شناسی:

مشخص‌ترین یافته آزمایشگاهی غیرمعمول در تمام مراحل عفونت فاسیولا هپاتیکا، اتوزینوفیلی است که غالباً بالاتر از ۵٪ می‌باشد و با لکوسیتوز (بین ۴۳۰۰۰-۱۰۰۰۰ در میلی متر مکعب) به ویژه در فاز حاد همراه می‌باشد. سطح هموگلوبین غالباً بین ۷-۱۱ گرم در دسی لیتر است، ولی سطوح پایین ۲/۸ و ۴ گرم در دسی لیتر نیز گزارش شده است. میزان ESR در فاز حاد ممکن است بالا بوده و حتی به ۱۶۵ میلی متر در ساعت برسد (۱۰ و ۳۸).

تست‌های عملکرد کبدی:

تست‌های غیرنرمال کبدی در هر دو مرحله حاد و انسدادی ممکن است مشاهده شوند. در مرحله حاد بیماری گاهی ALT (SGPT) و (SGOT)

AST، گلوبولین و بیلی روبین سرم افزایش می‌یابد. در سایر موارد، به استثنای آلكالین فسفاتاز (AKP)، نتایج تست‌ها نرمال است. الکتروفورز سرم افزایش  $\alpha_2$  و  $\gamma$  گلوبولین‌ها را نشان می‌دهد. در مرحله انسدادی، یرقان یک مشخصه بارز است. سطوح بیلی روبین سرم بین ۲ و ۸/۶ گزارش شده است (۱۰).

#### سطوح ایمونوگلوبولین‌ها:

مطالعه ایمونوگلوبولین‌های سرم حاکی از افزایش IgG، IgM و IgE است. آنتی بادی‌های IgE اختصاصی در ۴۸٪ بیماران نشان داده شده است. سطوح کلی و اختصاصی این ایمونوگلوبولین به طور مستقیمی با بار تخم (egg burden)، سن، مشخصات کلینیکی و درجه انوزینوفیلی ارتباط دارد. سطوح IgA معمولاً نرمال و ایزوتیپ‌های غالب ایجاد شده در عفونت IgG1 و IgG4 است (۱۰).

موارد کاربردی مهم در تشخیص فاسیولیاژیس در فاز حاد و مزمن :  
با وجود در دسترس بودن تست‌های تشخیصی موثری که در فوق مورد اشاره قرار گرفت، تشخیص فاسیولیاژیس به علت غیراختصاصی بودن تصویر بالینی و فقدان یک پروتکل تشخیصی استاندارد، مورد مباحثه است.

**نکات مهم در تشخیص فاسیولیازیس در فاز حاد و مزمن :****در مرحله حاد**

- ۱- سابقه مصرف سبزیجات خام و یا آب مشکوک ۲-۴ هفته قبل از ظهور علائم بالینی
  - ۲- نشانه‌های بالینی کاملاً متنوع که ممکن است شامل تب، کبد حساس، بزرگی طحال، برونشیت، پلورزی (ریزش جنب)، پنوموتوراکس چرکی و آسیت باشند.
  - ۳- ائوزینوفیلی
  - ۴- اثبات وجود آنتی بادی‌های ضد فاسیولا در سرم خون بیمار با استفاده از یک تست سرولوژیک معتبر مانند (Fas2-ELISA)
  - ۵- اثبات وجود آنتی ژنهای دفعی-ترشحي انگل (FES-Ag) در سرم خون و مدفوع بیمار
  - ۶- اثبات وجود DNA انگل در مدفوع با استفاده از روش PCR
  - ۷- استفاده از روش‌های تصویربرداری (اولتراسوند): کانون‌های هیپو اکوژنیک که روز به روز در کبد جابجا می‌شوند (۳۸).
- لارو نماتودهایی همچون توکسوکارا کانیس نیز در کبد نفوذ می‌کند بنابراین تشخیص افتراقی اصلی در فاز حاد شامل عفونت لاروهای مهاجر احشایی (Toxocariasis) می‌باشد. اثبات وجود لارو متحرک انگل در چشم با استفاده از یک افتالموسکوپ بیانگر ابتلای فرد به توکسوکاریازیس است.

### در مرحله مزمن و تأخیری

- ۱- کاربرد روش تلمن (Conic-cup sedimentation) که امکان آزمایش مقادیر بیشتری از نمونه مدفوع را فراهم می‌کند.
  - ۲- اثبات وجود آنتی بادی‌های ضد فاسیولا در سرم خون بیمار با استفاده از روش (Fas2-ELISA) به منظور تمایز بین عفونت فعال و گذشته.
  - ۳- اثبات وجود آنتی ژن‌های دفعی-ترش‌هی انگل در نمونه مدفوع بیمار.
  - ۴- اثبات وجود DNA انگل در مدفوع با استفاده از روش PCR
  - ۵- روش‌های تصویربرداری (التراسوند) که حساسیت آن در تشخیص عفونت در این مرحله کمتر از ۱۵٪ است.
- تشخیص افتراقی** در این مرحله شامل فیروز کیسه صفرا به علت عفونت ناشی از شیتوزوما مانسونی، کلونورکیازیس / اپیستورکیازیس و آسکاریازیس صفراوی می‌باشد (۳۸).

### تشخیص افتراقی

تشخیص‌های افتراقی در فاز نهفته مزمن عبارتند از: فیروز کیسه صفرا در اثر شیتوزوما مانسونی، کلونورکیازیس، اپیستورکیازیس و آسکاریازیس صفراوی

## درمان

تریکلابندازول (Triclabendazole) از سال ۱۹۸۳ در دامپزشکی برای درمان فاسیولیاژیس حیوانی به کار رفته است. این دارو در مقابل کرم‌های بالغ موجود در مجاری صفراوی و کرم‌های نابالغ مهاجر در کبد موثر می‌باشد، بنابراین برای درمان هر دو مرحله حاد و مزمن بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرد. تریکلابندازول چندین سال است در درمان بیماری انسانی هم به کار رفته است و با توجه به خصوصیتی از قبیل دوز درمانی واحد، تحمل خوب دارو و عدم وجود عوارض جانبی قابل توجه سبب شده است که تریکلابندازول به عنوان داروی انتخابی مورد توجه قرار گیرد و در حال حاضر در ایران به عنوان داروی انتخابی در درمان بیماری انسانی توسط کمیته کشوری مراقبت فاسیولیاژیس معرفی شده است.

دوز پیشنهادی شامل یک رژیم درمانی به میزان ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می‌باشد. اگرچه بروز حملات گذرای تب همراه با تغییراتی در تست های کبدی گزارش شده است؛ ولی تحمل کلینیکی دارو عالی می‌باشد. در صورتی که دارو بعد از غذا به مصرف برسد، جذب بهتری خواهد داشت. میزان موفقیت درمان با تک دوز 10mg/kg بین ۷۹/۴ تا ۸۳ درصد است در حالی که مصرف دو دوز 10 mg/kg از دارو در یک روز (با فاصله ۶-۱۲ ساعت) بعد از صرف غذا، با درمان صد درصد همراه بوده است (۱۰ و ۳۲ و ۳۹).

عوارض تریکلابندازول خفیف بوده و شایع ترین آن درد شکم، درد اپیگاستر و تعریق می باشد. عوارض کمتر شایع عبارتند از: خستگی، تهوع، استفراغ، سرگیجه، سرفه، تب، خارش و کهیر. (راش جلدی چندان شایع نمی باشد). بر اساس خبرنامه سازمان جهانی بهداشت در موارد درمان دسته جمعی یا هدفمند افراد آلوده در کشورهای هیپراندمیک (targeted treatment) کودکان زیر ۴ سال، زنان باردار و شیرده نباید با تریکلابندازول درمان شوند. این بدان معنی است که درمان این قبیل افراد بایستی در مراکز درمانی و تحت نظر پزشک صورت گیرد (۴۰).

جدول تجویز تریکلابندازول بر حسب وزن (۳۲)

Number of Triclabendazole Tablets(250 mg)	Dosage (mg)	Weight (kg)
1/2	125	≤ 12.5
1	250	> 12.5 - ≤ 25
1+ 1/2	375	> 25 - ≤ 37.5
2	500	> 37.5 - ≤ 50
2 +1/2	625	> 50 - ≤ 62.5
3	750	> 62.5 - ≤ 75
3 +1/2	875	> 75 - ≤ 87.5
4	1000	> 87.5 - ≤ 100

\* Emetine و Dehydroemetine: داروهای کلاسیکی هستند که با دوز 1mg/kg روزانه از طریق داخل عضلانی یا زیر جلدی به کار رفته اند. این داروها مؤثر بودند و هنوز هم در موارد خاص مورد استفاده قرار

می‌گیرند. با این حال به دلیل عوارض جانبی آنها (به‌ویژه سمیت قلبی)، چند نوع داروی دیگر در طول دهه‌های گذشته ساخته شده و در درمان بیماری به کار رفته است (۱۰).

**داروی بیتینول** Bithionol با دوز 50 mg/kg در سه دوز جداگانه به صورت یک روز در میان، به مدت ۱۵ روز تجویز می‌شود. این دارو در موارد وجود مقاومت به Emetine با موفقیت در درمان بیماران به کار رفته است. بیتینول نیز دارای عوارض سمی برای قلب است و بیمار باید در طول دارو درمانی استراحت کند.

### پیگیری و مراقبت پس از درمان

باتوجه به اینکه پس از شروع درمان ممکن است برخی علائم بالینی در بیمار ظاهر شود که با عوارض جانبی دارو اشتباه شود، بهتر است بیماران از نظر بروز علائم و نتایج درمانی در روزهای صفر (روز درمان)، روزاول (۲۴ ساعت پس از شروع درمان)، روزچهارم پس از درمان و یک هفته پس از آن پیگیری شوند. همچنین حدود یک ماه پس از درمان بایستی اقدامات تشخیصی مناسب برای اطمینان از حصول درمان کامل بیمار به عمل آید.



### معیارها و ملاک‌های مهم درمانی در بیماران مبتلا به فاسیولا

در فاز حاد ملاک‌های درمان بیماران عبارتند از (۳۸):

- ۱- تشدید موقت علائم بالینی که به دنبال آن بهبودی حاصل می‌شود.
- ۲- تست‌های آزمایشگاهی: کاهش تعداد ائوزینوفیل‌ها و سطح سرمی IgE که پس از آن کاهش سطح آنتی‌بادی‌های ضد فاسیولا و ناپدید شدن آنتی‌ژن‌های دفعی-ترش‌حی فاسیولا در سرم اتفاق خواهد افتاد.
- ۳- رادیوگرافی: هیچ مطالعه سیستماتیک در این زمینه انجام نشده است. نتایج التراسوند که به صورت تجربی تشریح شده اند عبارتند از: ناپدید شدن کانون‌های مهاجر هیپواکوئیک (در سونوگرافی مناطقی از کبد که دچار آسیب شده‌اند در مقایسه با بافت سالم اطراف دارای اکوی ضعیف و یا فاقد آن می‌باشد) در کبد و پسرفت اسپلنومگالی. همچنین ناپدید شدن عوارض بیماری (خونریزی، آسیت و ریزش جنب) پس از درمان مشاهده شده است.

### در فاز مزمن سه ملاک اولیه درمان می‌بایست تا روز ۶۰ محقق گردد (۳۸)

- ۱- پاک شدن مدفوع از تخم انگل (انجام آزمایش بر روی سه نمونه مدفوع با استفاده از تکنیک سدیمان‌تاسیون در ظروف مخروطی پایه دار یا روش تلمن)
- ۲- منفی شدن آنتی ژن‌های دفعی-ترش‌حی فاسیولا در مدفوع
- ۳- فقدان تصاویر هلالی قابل مشاهده در التراسوند

### سایر ملاک‌های درمان عبارتند از:

- ۴- کولیک صفراوی همراه با اتساع مجاری صفراوی و افزایش گذرای گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز و آلکالن فسفاتاز در روز ۷-۱ پس از درمان
- ۵- کاهش آنتی بادی‌های ضد فاسیولا
- ۶- ناپدید شدن ائوزینوفیلی
- ۶- ناپدید شدن IgE

ملاک‌ها و معیارهای مهم شکست درمان (۳۸):  
محقق شدن هر یک از ملاک‌های زیر تا روز ۶۰ به‌عنوان شکست درمان تلقی می‌شود:

- ۱- اثبات وجود تخم انگل در مدفوع
- ۲- پایدار ماندن آنتی ژن‌های دفعی - ترشحات فاسیولا در مدفوع
- ۳- مشاهده هلال در بررسی سونوگرافی

سایر ملاک‌های شکست درمان عبارتند از:

- برطرف نشدن تهوع، خارش و درد شکمی
- افزایش تیتراژ آنتی بادی‌های ضد فاسیولا
- باقیماندن ائوزینوفیلی
- پایدار ماندن IgE



## فصل سوم

برنامه مراقبت اپیدمیولوژیکی فاسیولیازیس

## تعاریف بیماری

### طبقه‌بندی بیماری (تعاریف)

طبقه‌بندی موارد فاسیولیازیس براساس نظریه کمیته فنی کشوری

مورد مشکوک:

وجود علائم بالینی عمومی (تب با منشأ ناشناخته، دردهای غیر تپیک ناحیه شکم، بزرگی کبد همراه با تاریخچه مصرف سبزیجات خام یا مواد غذایی تهیه شده از آن، سابقه قبلی فاسیولیازیس در خانواده و نوشیدن آب‌های سطحی روباز مثل چشمه‌ها ۲-۴ هفته قبل از بروز بیماری).

مورد محتمل:

مورد مشکوک + ائوزینوفیلی بالا (تعداد مطلق بیش از ۵۰۰) و یا لکوسیتوز یا یافته‌های سونوگرافی مثبت + تست سرولوژی مثبت.

مورد قطعی:

مورد مشکوک یا محتمل + اثبات وجود تخم انگل در نمونه مدفوع بیمار یا مواد به‌دست آمده از تویاز اثنی عشر.

### تعریف آلودگی مزمن

اثبات وجود تخم انگل در نمونه مدفوع با رعایت استانداردهای لازم همراه با مواردی چون:

وجود اختلالات صفراوی (التهاب مجاری صفراوی و کیسه صفرا) + وجود یرقان انسدادی مداوم یا متناوب.

### ۱- طبقه‌بندی جدید اپیدمیولوژیک فاسیولیازیس انسانی

امروزه محققین درک متفاوتی از وضعیت اپیدمیولوژیک فاسیولیازیس انسانی پیدا کرده‌اند. مناطق متعددی برای این بیماری آندمیک شده و به علت قدرت تطابق بالای انگل و قدرت کلونیزاسیون ذاتی گونه‌های لیمنه‌ناقل، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای توسعه انتشار جغرافیایی بیماری انسانی وجود دارد. اکنون فاسیولیازیس فقط به عنوان یک بیماری زئونوتیک ثانویه مطرح نیست و بایستی بعنوان یک بیماری انگلی انسانی مهم مد نظر قرار گیرد. لذا الگوی اپیدمیولوژیکی انتقال بیماری به انسان بسیارگسترده است که نشان‌دهنده تطابق انگل با شرایط مختلف محیطی می‌باشد.

**بر این اساس طبقه‌بندی جدیدی به شرح زیر برای فاسیولیازیس انسانی پیشنهاد شده است (۴ و ۱۰)**

#### ۱-۲- موارد وارده (Imported cases)

شناسایی موارد انسانی بیماری در مناطقی که در آن آلودگی انسانی و حیوانی دیده نشده است، یعنی فاسیولا هپاتیکا یا فاسیولا ژیگانیتیکا حتی در بین حیوانات آن مناطق نیز وجود ندارد.

### ۲-۲- بومی (Autochthonous, isolated, nonconstant cases)

انسان‌ها عفونت را در محل زندگی خود کسب می‌کنند در این مناطق فاسیولیازیس حیوانی نیز وجود دارد و موارد انسانی بیماری هم به صورت تک‌گیر دیده می‌شود.

### ۲-۳- موارد آندمیک (Endemic)

بر اساس شیوع عفونت در جمعیت کلی که با روش‌های آزمایش مدفوع (کوپرولوژیک) تعیین می‌شود، به‌طور کلی سه حالت آندمیسیته شرح داده شده است.

#### الف- مناطق هیپوآندمیک (Hypoendemic)

شیوع بیماری در این مناطق زیر یک درصد بوده و میانگین شدت آن کمتر از ۵۰ تخم در گرم مدفوع ( $<50$  epg) است. نقش انسانها در انتقال بیماری می‌تواند نادیده گرفته شود.

#### ب- مناطق مزوآندمیک (Mesoendemic)

شیوع بیماری انسانی بین ۱۰-۱ درصد بوده و شیوع‌های بالاتر ممکن است در گروه سنی ۵-۱۵ سال مشاهده شود. میانگین شدت آن در جمعیت‌های انسانی معمولاً ۳۰۰-۵۰ تخم در گرم مدفوع (۳۰۰-۵۰ epg) است و افراد واجد سطوح بالای epg ممکن است یافت شوند. انسان‌ها از طریق دفع تخم ممکن است در انتقال بیماری نقش داشته باشند.



### ج- مناطق هیپرآندمیک (Hyperendemic)

شیوع فاسیولیازیس بالای ۱۰٪ و میانگین شدت در جمعیت‌های انسانی معمولاً بیش از ۳۰۰ تخم در گرم مدفوع است ( $> 300$  epg). معمولاً گروه سنی ۱۵-۵ سال شیوع بالاتری را نشان می‌دهد. شدت بالای عفونت با epg بیش از ۱۰۰۰ به فراوانی دیده می‌شود. افراد آلوده از طریق دفع تخم نقش قابل ملاحظه‌ای در انتقال فاسیولیازیس دارند.

### ۳- موارد اپیدمیک (Epidemic)

انواع متفاوتی از همه‌گیری با توجه به آندمیک و یا غیر آندمیک بودن منطقه وجود دارد:

**الف- همه‌گیری در مناطقی که فاسیولیازیس در حیوانات آندمیک است نه در انسان.**

معمولاً این قبیل اپیدمی‌ها در مناطقی رخ می‌دهد که موارد اسپورادیک عفونت انسانی قبلاً از آنجا گزارش شده و همیشه افراد معدودی که از یک منبع آلودگی تغذیه کرده‌اند را در بر می‌گیرد. (گزارش آلودگی افراد یک خانواده یا سایر گروه‌های کوچک که از سبزیجات وحشی یا کشت شده واجد متاسرکر تغذیه کرده‌اند).

**ب- اپیدمی در مناطق آندمیک انسانی**

این شکل از اپیدمی‌ها در مناطقی رخ می‌دهد که فاسیولیازیس انسانی آندمیک است. تعداد افراد آلوده بسیار زیادتر بوده و شرایط آب و هوایی مناسب برای ابقاء انگل (متاسرکر) و حلزون‌های ناقل با وقوع این اپیدمی‌ها مرتبط دانسته شده است. اپیدمی‌ها ممکن است در هر سه مناطق هیپو، مزو و هیپر آندمیک اتفاق افتد (۴ و ۱۰).

**اقدامات پیشگیری و کنترل فاسیولیازیس**

- ۱- آشنا نمودن جمعیت‌های انسانی به‌ویژه در مناطق آندمیک با سیر تکاملی بیماری و روش‌های انتقال عفونت به انسان و همچنین راه‌های جلوگیری از سرایت آن به افراد جامعه.
- ۲- خودداری ساکنین مناطق آندمیک از مصرف خام گیاهان آبی‌زی وحشی و همچنین سبزیجات محلی (ترتیزک، شاهی وحشی، چوچاق، خالیواش، پونه صحرایی، بولاغ اوتی و...)، پختن و یا خشک کردن آنها قبل از مصرف.
- ۳- کاشتن سبزیجات محلی مورد علاقه برای مصرف در محل‌های مناسب تحت شرایط کاملاً کنترل شده و بدون امکان دسترسی حلزون‌ها و حیوانات نشخوارکننده به آنها.

- ۴- شستشوی دقیق سبزیجات مصرفی و سپس ضدعفونی آن در محلول ۲۴ میلی گرم در لیتر پرمنگنات پتاسیم به مدت ۱۰ دقیقه و یا محلول ۱۲۰ میلی لیتر سرکه (یک استکان) در یک لیتر آب، به مدت ۱۰ دقیقه.
- ۵- خودداری از مصرف کود حیوانی و عدم استفاده از فاضلاب خام انسانی جهت آبیاری سبزیکاری‌ها و مزارع کشاورزی.
- ۶- مبارزه با حلزون‌های ناقل در مناطقی که از نظر اجرایی عملی و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
- ۷- عدم استفاده از آب‌های آلوده (آب‌های سطحی) برای آبیاری و یا شستشوی سبزیجات و ظروف آشپزخانه.
- ۸- تأمین آب شرب بهداشتی برای مردم به‌ویژه در مناطق آندمیک و پرهیز از آشامیدن آب‌های سطحی همچون آب چشمه‌های روباز در مناطق بیلاقی.
- ۹- اقدامات موثر ادارات دامپزشکی در درمان به‌موقع و کامل کلیه مخازن عفونت (نشخوارکنندگان اهلی) به منظور کاهش شدت عفونت در دام‌ها.

### اقدامات لازم در همه‌گیری‌ها

۱- معرفی راه‌های احتمالی ابتلا به عفونت‌های انسانی و نحوه پیشگیری از ابتلای به آن جهت آگاهی ساکنان مناطقی که فاسیولیازیس در آن به صورت همه‌گیری درآمده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین اقدامات لازم برای کاهش میزان انتقال و انسیدانس فاسیولیازیس است.

۲- توصیه اکید به عدم مصرف سبزیجات و گیاهان آبرزی و یا گیاهان خشکی زی بصورت خام و ناپخته که ممکن است طی ماه‌هایی از سال در معرض تماس با آب بوده‌اند. منابع آبی که واجد حلزون‌های ناقل بوده و دام‌ها به آن دسترسی داشته باشند محیط بسیار مناسبی برای برقراری چرخه زندگی انگل و ایجاد کانون‌های انتقال می‌باشند.

۳- درمان افراد آلوده جهت رفع عفونت و کاهش آلام آنان و همچنین خاطر نشان کردن خطر دفع مدفوع در محیط خارج، بمنظور کاهش احتمال انتقال عفونت.

۴- شناسایی وجود آلودگی در دام‌های منطقه توسط ادارات دامپزشکی و اقدام به درمان دسته جمعی کلیه مخازن عفونت (نشخوارکنندگان اهلی).

### هدف کلی

کنترل بیماری فاسیولیازیس در جمهوری اسلامی ایران.

### اهداف اختصاصی

- ۱- کاهش میزان بروز فاسیولیازیس در جمعیت‌های انسانی ساکن در مناطق آندمیک.
- ۲- کاهش عوارض و هزینه‌های ابتلا به بیماری.
- ۳- افزایش آگاهی کارکنان بخش بهداشت و درمان.
- ۴- افزایش آگاهی جامعه در مورد راه‌های انتقال و پیشگیری بیماری فاسیولیازیس.
- ۵- کاهش میزان بروز فاسیولیازیس در جمعیت دامی مناطق آندمیک.

### استراتژی‌های برنامه جامع کنترل فاسیولیازیس در ایران

۱. تعیین یک کمیته کشوری فاسیولیازیس متشکل از افراد صاحب‌نظر با تخصص‌های مختلف مورد نیاز از سازمان‌های مرتبط، به منظور کمک به مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در خصوص مدیریت و تدوین یک استراتژی صحیح و علمی برای مبارزه با بیماری در کشور.
۲. برقراری ارتباط تنگاتنگ بین سازمان‌های مختلف ذیربط، تعیین برنامه کاری برای هر سازمان، پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات مورد نظر در زمان‌های معین و تقویت هماهنگی‌های درون بخشی و بین بخشی.

۳. برقراری ارتباط و جلب مشارکت سازمان‌های بین‌المللی مرتبط (EMRO&FAO & WHO).
۴. آموزش عموم جامعه، به ویژه در مناطق در معرض خطر، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی (رسانه‌ها).
۵. ارتقاء آگاهی کارکنان شاغل در نظام سلامت و شبکه‌های دامپزشکی در خصوص جنبه‌های مختلف فاسیولیازیس انسانی و حیوانی.
۶. بیماریابی و کشف موارد عفونت‌های انسانی در مناطق مختلف.
۷. فراهم کردن و یا ارتقاء امکانات تشخیصی در سطح مراکز بهداشتی (خریداری کیت‌های Kato-Katz و ELISA) و توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی فاسیولیازیس جهت تشخیص به موقع و صحیح بیماری.
۸. آموزش کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی استان‌های مختلف کشور به منظور کسب توانایی در خصوص انجام آزمایشات اولیه غربالگری (انجام تست کاتو و تهیه نمونه سرم خون از مراجعه‌کنندگان).
۹. تهیه داروی ایگاتن به میزان مورد نیاز کشور از طریق مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و ارسال آن به مراکز بهداشتی نواحی در معرض خطر در کشور.

۱۰. درمان منظم و برنامه‌ریزی شده دام‌ها به‌ویژه در مناطق آندمیک.
۱۱. ارتقاء نظام ثبت اطلاعات و گزارش‌دهی.
۱۲. انجام پژوهش‌های کاربردی و بنیادی بر اساس نیازهای هر منطقه.
۱۳. تقویت و توسعه منابع (انسانی، تکنولوژی و مالی).
۱۴. ارزشیابی و پایش مستمر برنامه.

### وظایف و فعالیت‌ها

وظایف و فعالیت‌ها در قالب سطح بندی ارائه خدمات در کشور انجام می‌شود:

### شرح وظایف سطوح مختلف نظام سلامت در مراقبت برنامه فاسیولیازیس

#### وظایف و فعالیت‌های سطح کشوری

- ۱- اتخاذ سیاست‌های کلان و جامع بر اساس یافته‌های علمی و امکانات اجرایی کشور
- ۲- تقویت و گسترش هماهنگی‌های بین بخشی با سازمان‌های ذیربط.
- ۳- تقویت و گسترش هماهنگی‌های درون بخشی و بین بخشی با سازمان‌های مرتبط
- ۴- تشکیل کمیته فنی کشوری و برگزاری جلسات آن برحسب نیاز

- ۵- بازنگری اولیه و مستمر فرم های مراقبت، گزارش دهی با هدف بهبود نظام ثبت و گزارش دهی.
- ۶- بازنگری در پروتکل مراقبت بیماری بر اساس آخرین یافته های علمی و اجرایی.
- ۷- برنامه ریزی، نظارت، مراقبت و ارزشیابی بر اجرای برنامه مبارزه با بیماری.
- ۸- تعیین اولویت های تحقیقی جهت اجرا در مناطق مختلف کشور با کمک اعضای کمیته کشوری فاسیولیازیس و اعلام آن به مراکز دانشگاهی جهت اجرا.
- ۹- تعیین دقیق سیمای انتشار بیماری در دام ها و انسان ها و تعیین نقاط آلوده کشور با جلب همکاری سازمان دامپزشکی.
- ۱۰- بهره گیری از همکاری افراد صاحب نظر و مشاوره مستمر با آنان در زمینه برنامه ریزی در سطح کلان.
- ۱۱- ایجاد هماهنگی های لازم در سطوح مختلف اجرایی و ستادی بخش بهداشت در جهت اجرای برنامه.
- ۱۲- تهیه و تدوین و توزیع متون آموزشی و کمک آموزشی، تنظیم برنامه های آموزشی برای سطوح مختلف شامل: گردهمایی سالیانه کشوری، کارگاه های آموزشی.



- ۱۳- برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی کشوری با هماهنگی دانشگاه‌های کشور و سازمان دامپزشکی و محیط زیست برای کارشناسان، پزشکان، دامپزشکان و کارشناسان آزمایشگاه‌ها.
- ۱۴- جمع‌آوری آخرین دستاوردهای علمی مبارزه با بیماری و در اختیار قرار دادن آنها در حوزه معاونت بهداشتی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها.
- ۱۵- جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل داده‌ها.
- ۱۶- تهیه و ارائه گزارش اجرای برنامه و تهیه پس‌خوراند به سطوح محیطی.
- ۱۷- گزارش وضعیت بیماری به سازمان‌های بین‌المللی.
- ۱۸- پیش‌بینی و پیگیری تهیه داروهای مورد نیاز درمان موارد آلوده انسانی از طریق مجامع بین‌المللی و توزیع آن بین دانشگاه‌ها.

#### وظایف و فعالیت‌های سطح دانشگاه (استانی)

- ۱- تقویت و گسترش هماهنگی‌های بین بخشی در استان با سازمان‌های ذیربط (باید توجه داشت که موفقیت و دسترسی به اهداف هر برنامه مستلزم ایجاد هماهنگی بین بخشی مداوم و مستمر بین بخش بهداشت و دامپزشکی استان می‌باشد که می‌تواند با استفاده از امکانات موجود در هر دو بخش و همسو ساختن این

- امکانات و برنامه‌ریزی صحیح مشترک در کنترل این بیماری گام بردارند).
- ۲- تعیین یک کمیته استانی فاسیولیازیس در مناطق آندمیک جهت هماهنگ کردن برنامه‌های مبارزه با بیماری زیر نظر رییس دانشگاه.
- ۳- تهیه، تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه مراقبت بیماری فاسیولیازیس
- ۴- اجرای برنامه‌های آموزشی و بازآموزی در سطوح مختلف.
- ۵- تهیه مطالب و جزوات آموزشی مناسب بر اساس راهنمای کشوری به منظور آموزش پرسنل و جامعه.
- ۶- هماهنگی با رسانه‌های گروهی به منظور تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی.
- ۷- جمع‌آوری اطلاعات محیطی و دسته‌بندی و آنالیز و تهیه گزارش و ارسال آنها به بخش‌های مورد نظر.
- ۸- تعیین میزان‌های شیوع و بروز فاسیولیازیس در سطح استان.
- ۹- بررسی فاکتورهای خطر بیماری در سطح استان.
- ۱۰- گزارش مستمر و ماهیانه انجام برنامه به سطوح کشوری.

- ۱۱- تهیه و تدارک دارو از طریق مسئولین برنامه در وزارتخانه یا سازمان‌های ذریبط و توزیع آن در محیط.
- ۱۲- حمایت از تحقیقات کاربردی در زمینه فاسیولیزیس در سطح استان.
- ۱۳- همکاری با مراکز دانشگاهی استانی و خارج استانی در زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی مورد نیاز.
- ۱۴- هماهنگی بین بخشی با سازمان دامپزشکی، شهرداری، محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذریبط.
- ۱۵- سنجش کیفی فعالیت آزمایشگاه‌های مراکز بهداشت در سطح استان.

#### وظایف و فعالیت های سطح شهرستان

- ۱- اقدامات مرتبط با بیماریابی شامل شناخت موارد مظنون، محتمل و قطعی و اقدام به درمان مناسب آنها با توجه به دستورالعمل مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر.
- ۲- تهیه و تدارک دارو از طریق سطوح استانی.
- ۳- آموزش جنبه‌های مختلف بیماری (چرخه زندگی، راه‌های انتقال، شیوه‌های پیشگیری و ...) به عموم مردم از طریق

- رسانه‌های محلی و تهیه پمفلت، تراکت و آموزش چهره به چهره از طریق بهورزان و رابطین.
- ۴- آموزش نیروهای درگیر برنامه با همکاری سازمان دامپزشکی.
- ۵- هماهنگی‌های بین بخشی با سازمان‌های دامپزشکی و محیط زیست.
- ۶- جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص شیوه زندگی، عادات غذایی، نوع سبزیجات مصرفی، نوع آب آشامیدنی، وضعیت تماس با دام‌ها و هر نوع اطلاعی که به امر کنترل بیماری کمک کند.
- ۷- تشکیل شورای هماهنگی مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان در سطح شهرستان.
- ۸- تبادل مستمر اطلاعات با شبکه دامپزشکی استان.
- ۹- پایش و نظارت مستمر بر چگونگی اجرای برنامه به منظور تشخیص انحرافات و اصلاح آنها.
- ۱۰- تجهیز حداقل یک آزمایشگاه در سطح شهرستان با همکاری بخش خصوصی.
- ۱۱- برنامه‌ریزی اصولی جهت پیگیری وضعیت افراد درمان شده (کنترل درمان).

- ۱۲- تکمیل فرم‌های خلاصه اطلاعات اپیدمیولوژیک و پیگیری موارد مثبت و ارسال آنها به استان.
- ۱۳- ثبت اطلاعات موارد بیماری بعد از تأیید قطعی هر مورد مثبت توسط پزشک معالج و نتیجه آزمایشگاه.
- ۱۴- تهیه، تدوین و اجرای برنامه عملیاتی مراقبت بیماری در سطح شهرستان.

#### وظایف و فعالیت‌های سطح محیطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت تابعه)

- ۱- آموزش مردم در روستاها توسط بهورزان و پرسنل مراکز بهداشتی درمانی روستایی و در شهرها توسط رابطین و مراکز شهری.
- ۲- بررسی سیمای اپیدمیولوژیک بیماری در جمعیت تحت پوشش.
- ۳- شناخت موارد مظنون به بیماری و تکمیل فرم نمونه‌گیری و ارجاع به آزمایشگاه و اقدام به درمان و پیگیری موارد مثبت با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان.
- ۴- در صورتی که مورد مثبت انتقال محلی باشد باید مراتب سریعاً به ستاد شهرستان اطلاع داده شود.

- ۵- در صورتی که مورد مثبت وارد از سایر شهرستان های استان و یا سایر نقاط کشور باشد مراتب به ستاد استان مورد نظر اطلاع داده شود.
- ۶- آموزش بهورزان تحت پوشش و رابطین مراکز شهری و سایر پرسنل و نیروهای درگیر برنامه به طور مداوم.
- ۷- نظارت بر برنامه های اجرایی و آموزشی توسط پرسنل خانه های بهداشت و مراکز.
- ۸- جمع آوری اطلاعات و دسته بندی طبق فرم های موجود و ارسال آن به شهرستان.
- ۹- همکاری در امر مبارزه با حلزون در منطقه تحت پوشش.
- ۱۰- همکاری با نیروهای اعزامی از حوزه بهداشت و دامپزشکی به منظور بیماریابی و درمان موارد در انسان و دام.
- ۱۱- همکاری در انجام امور تحقیقاتی با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخل و خارج استان.

فرم‌های ثبت و جمع‌آوری و گزارش

داده‌های نظام مراقبت فاسیولیاژیس

## وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز بهداشت استان

مرکز بهداشت شهرستان...

فرم بیماریابی فاسیولیازیس (فرم شماره ۱)

نام و نام خانوادگی :	نام پدر:
سن :	جنس:
شغل اصلی:	شغل فرعی:
تحصیلات :	تعداد افراد خانوار:
آدرس محل سکونت:	
تلفن:	
علائم بیماری:	
<p><b>در صورت داشتن هر یک از علائم دور آن خط کشیده شود.</b></p> <p>تب درد شکم اختلالات گوارشی کهیر مشکلات تنفسی درد عضلات درد  در ناحیه شانه کم خونی  زردی خارش پوست</p> <p>تاریخ شروع اولین علائم بیماری :</p> <p>آیا بیمار در چند ماه گذشته سابقه مصرف سزپیجات خود روی محلی (آبزی و خشکی زی) یا سایر سزپیجات خام دارد ؟ بلی خیر</p> <p>آیا بیمار در چند ماه گذشته سابقه نوشیدن آب های سطحی یا شنا در آن را دارد ؟ بلی خیر</p> <p>آیا فرد دیگری در خانواده مبتلا به فاسیولیازیس شده است؟ بلی خیر</p> <p>تعداد مبتلایان:</p>	
<p>آیا فرد سابقه مسافرت در ۶-۲ ماهه گذشته را دارد؟ بلی خیر</p> <p>در صورت جواب مثبت محل مسافرت ذکر گردد.</p>	
نام و نام خانوادگی وامضاء تکمیل کننده پرسشنامه :	







## (References) منابع

- 1- Mas-Coma S. Bargues M.D. Valero M.A. Fascioliasis and other plant-borne trematode zoonoses. *International Journal for Parasitology*, 2005, 35:1255–1278.
- 2- World Health Organization. Control of foodborne trematode infections. *WHO Tech. Rep. Ser.* 1995; 849, 1–157.
- 3- S. Mas-Coma, A. Rodriguez, M.D. Bargues, M.A. Valero, J.R Coello, & R. Angles. Secondary reservoir role of domestic animals other than sheep and cattle in fascioliasis transmission in the Northern Bolivian Altiplano. *Research and Reviews in Parasitology*, 1997; 57:39-46.
- 4- S. Mas-Coma. Parasitic diseases, global change and the developing world: the example of emerging fascioliasis. *Scientia Parasitologica*; 2007, 1:10-27.
- 5- Esteban J.G., Bargues M.D and Mas-Coma S. Geographical distribution, diagnosis and treatment of human fascioliasis: a review, *Research and Reviews in Parasitology*. 1998; 58-1: 13-42.
- 6- Mas-Coma S., Esteban J.G. and Bargues M.D. Epidemiology of human fascioliasis: a review and proposed new classification. *Bulletin of the WHO*, 1999; 72(4).
- 7- Chen M.G. and Mott K.E. Progress in assessment of morbidity due to *Fasciola hepatica* infection: a review of recent literature. *Tropical Disease Bulletin*. 1990; 87(4): R<sub>1</sub>-R<sub>38</sub>.
- 8- Ashrafi K., Valero M.A., Panova M., Periago M.V., Massoud J., Mas-Coma. Phenotypic analysis of adults of

- Fasciola hepatica, Fasciola gigantica and intermediate forms from the endemic region of Gilan, Iran. *Parasitology International*, 2006, 55:249–260.
- 9- Valero M.A., Periago M.V., El Sayed M., Ashrafi K., El Wakeel A., Mohamed M.Y., Desquesnes M., Curtale F. & Mas-Coma S. Phenotypic description of Fasciola hepatica/Fasciola gigantica intermediate forms from the human endemic area of the Nile Delta, Egypt. *Infection, Genetics and Evolution*, 2008; 8: 51-58.
  - 10- Mas-Coma S., Bargues M. D. Human liver flukes. A review. *Research and Reviews in Parasitology*, 1997; 57:145-218.
  - 11- Massoud. J. and Sajadi S. Susceptibility of different species of *Lymnaea* snails to miracidia of *Fasciola gigantica* and *F. hepatica* in Iran. *Journal of Helminthology*, 1980; 54: 201-202.
  - 12- Cruz-Reyes A. and Malek E.A. Suitability of six lymnaeid snails for infection with *Fasciola hepatica*. *Veterinary Parasitology*, 1987; 24: 203-210.
  - 13- Arfaa F., Movafagh K. and Mahdavi M. *Lymnaea gedrosiana*, an intermediate host of Fasciola hepatica in Iran. *Journal of Parasitology*, 1969; 55(1): 134-34.
  - 14- Ashrafi K. Phenotypic and genotypic analysis of fasciolids and their relationships with lymnaeid snails in Gilan province, northern Iran. Dissertation for Ph.D degree, Faculty of Health of Tehran University of Medical Sciences, 2004.
  - 15- Ashrafi K, Massoud J., Khoubbane M., Ebadati N., Majidi-shad B., Rahmati B., Raji M., Hadiani M.R., Najafi F., Valero M.A, Fuentes M.V., Bargues M.D., Mas-Coma S. The experimental demonstration of

- Lymnaea gedrosiana* as a potential intermediate host for transmission of fascioliasis in the endemic zone of Guilan province , Northera Iran. In: abstracts of 9<sup>th</sup> European Multicolloquium of Parasitology, Valencia, Spain, 18-23 July 2004, P-278.
- 16- Mas-Coma, S., Bargues, M.D., Valero, M.A., Fuentes, M.V. Adaptation capacities of *Fasciola hepatica* and their relationships with human fascioliasis: from below sea level up to the very high altitude. In: Combes, C., Jourdane, J. (Eds.), *Taxonomy, Ecology and Evolution of Metazoan Parasites*, 2003; vol. 2. Perpignan University Press Perpignan, pp. 81–123.
- 17- Valero, M.A., Marcos, M.D., Fons, R., Mas-Coma, S., *Fasciola hepatica* development in experimentally infected black rat, *Rattus rattus*. *Parasitology research*, 1998; 84:188–194.
- 18- Valero, M.A., Panova, M., Comes, A.M., Fons, R., Mas-Coma, S. Patterns in size and shedding of *Fasciola hepatica* eggs by naturally and experimentally infected murid rodents. *Journal of Parasitology*, 2002; 88: 308–313.
- 19- Esteban J.G., Flores A., Aguirre C., Strauss W., Angles R., and Mas-Coma S. Presense of very high prevalence and intensity of infection with *Fasciola hepatica* among Aymara children from the Northern Bolivian Altiplano. *Acta Tropica*. 1997; 66: 1-14.
- 20- Gaillet P., Liance M., Rivolet D. and Houin R., Situaton de la fasciolose humaine en France, enquete retrospective portant sur les 30 dernieres annees. *Bulletin de la Societe Francaise de Parasitologie*, 1983; 1: 79-82.

- 21- Danis M., Nozais J.P. and Chandener J. La distomatose a *Fasciola hepatica*. II: La Fasiolose humaine en France. *Action veterinaire*, 907: VII-VIII.
- 22- Sampaio Silva M.L. et al. Antigenic components of excretory secretory products of adult *Fasciola hepatica* recognized in human infections. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 1996; 54: 146-148.
- 23- Sorribes J., Pascual F.J., Aubary M.J., Gil-Benito A. and Mas-Coam S. La Fascioliasis en Espnia: revision de la casuistica humana en las dos ultimas decadas. In: VI congreso Nacional Y I congreso Iberico de Parasitologia (Cacres, Spain), Resumens de comunicaciones: 1989; 259.
- 24- Anonymous. *Fasciola hepatica*. *British Medical Journal*. 1969; 3:63.
- 25- World Health Organization. Control of foodborne trematode infections. *WHO Technical Series*. WHO, Geneva, 1995; 849:1-157.
- 26- Mas-Coam S. Human fascioliasis in Bolivia: a general analysis and a critical review of existing data. *Research and reviews in Parasitology*. 1995; 55: 73-93.
- 27- Esteban J.G., Flores A., Aguirre C., Strauss W., Angles R. and Mas- Coam S. Presense of very high prevalence and intensity of infection with *Fasciola hepatica* among Aymara childern from the Northern Bolivian Altiplano. *Acta Tropica*. 1997; 66: 1-14.
- 28- Angeles R., Strauss W, Ramirez S., Esteban J.G. and Mas-Coam S. Human Fascioliasis in Bolivia: Coprological surveys in different provinces of Department of La Paz. *Research and Reviews in Parasitology* 1997; 57: 33-37.

- 29- Hillyer G.V. Foodborne trematode infections in Americas. *Parasitology Today*, 1997; 13: 87-88.
- 30- Ashrafi K., Massoud J., Holakuei Naieni K., Mahmoodi M., Jo-afshani M.A., Valero M.A., Fuentes M.V., Khoubbane M., Artigas P., Bargues M.D. and Mas-Coma S. Evidence suggesting that *Fasciola gigantica* may be the most prevalent causal agent of fascioliasis in the endemic province of Gilan, northern Iran. *Iranian Journal of Public Health*, 2004; 33 (4):31-37.
- 31- Massoud J. Fascioliasis outbreak in man and drug test (Triclabendazole) in Caspian Littoral Northern Iran. *Bull. Soc. Farn. Parasitol.* 1989; 8: 438-439.
- 32- World Health Organization. The “neglected” neglected worms, Action against worms, December 2007, issue 10, WHO, Geneva, Switzerland.
- 33- Boray J. C. Experimental fascioliasis in Australia. *Advances in Parasitology*, 1969; 7: 95-210.
- 34- Sabbaghian H., Bijan H. and Arfaa F. Data on trematode infections among livestock in Khuzestan, Iran. *Bull. Tehran Coll. Vet. Med.* 1964 (in Persian).
- 35- Sahba G.H., Arfaa F., Farahmandian I. and Jalali H. Animal fascioliasis in Khuzestan, South western Iran. *Journal of Parasitology*, 1972; 58(4): 712-16.
- 36- ashrafi K., Massoud J., Molavi G., Shahtaheri S.J., Mas-Coma S. Geographical distribution of lymnaid snails in Gilan Province, northern Iran. *5<sup>th</sup> National Iranian Congress of Parasitology, Shaidbeheshti University of Medical Sciences*, 2005; Tehran, Iran.
- 37- Moghaddam AS, Massoud J, Mahmoodi M, Mahvi AH, Periago MV, Artigas P, Fuentes MV, Bargues MD, Mas-Coma S. Human and animal fascioliasis im Mazandaran

- province, northern Iran. *Parasitology Research*. 2004 Sep;94(1):61-69
- 38- Mas-Coma S. Epidemiology of fascioliasis in human endemic areas. *Journal of Helminthology*, 2005; 79: 207-216.
- 39- World Health Organization. Report of the WHO Informal Meeting on use of Triclabendazole in Fascioliasis control. 17-18 October 2006, WHO headquarters, Geneva, Switzerland.
- 40- World Health Organization. Action against worms. December 2007, issue 10. p 1-8.