

همکاران محترم موارد زیر لازم است در بوکلت های مانا اصلاح شود:

بوکلت مانا پزشک :

صفحه ۵ : در جدول انفوزیون مایعات وریدی و دو سطر زیر جدول حجم رینگر لاکتات  
20 ml/kg :

صفحه ۶: در چارت شماره ۶ در جمله اگر کودک تب بالا دارد .... به ص ۲۵ مراجعه کنید

صفحه ۹ : در ردیف آخر جدول ( اسهال خونی) و ستون تشخیص نوع درمان، یک بولت به ابتدای اقدامات اضافه شود، برای مدت ۵ روز آنتی بیوتیک مناسب بدهید (ص ۲۶)

صفحه ۳۷ : در ردیف اول جدول در ستون درمان بولت آخر، اگر انتقال امکان پذیر نیست به صفحه ۴۶ مراجعه کنید.

صفحه ۳۷ : در اولین ردیف زرد جدول (عفونت موضعی باکتریال ) درستون تشخیص نوع درمان، آموکسی سیلین (۵۰ میلی گرم / کیلوگرم برای ۵ روز

صفحه ۳۷: در دومین ردیف زرد جدول، طبقه بندی به " عفونت باکتریال موضعی خفیف " تغییر یابد.

صفحه ۴۶: جدول تزریق آنتی بیوتیک در ستون تجویز آمپی سیلین : یک ویال ۲۵۰ میلی گرم در ۱،۳ میلی لیتر آب مقطر حل شود

بوکلت مانا غیر پزشک :

صفحه ۸ : بولت آخر ( برای مدت ۵ روز آنتی بیوتیک مناسب بدهید حذف شود)

صفحه ۲۲ : ردیف اول زرد رنگ طبقه بندی به " عفونت باکتریال موضعی خفیف " تغییر یابد.